

النطق

(doks oh ROO bi sin lye po SO mal)

أسماء العلامات التجارية الأمريكية

- Doxil
- Lipodox 50
- [Lipodox (DSC

أسماء العلامات التجارية الكندية

- Caelyx

تحذير

• قد يتسبب هذا العقار في ظهور مشكلات خطيرة للغاية في القلب مثل قصور القلب. قد يحدث هذا الأمر أثناء العلاج أو خلال فترة تمتد من شهر إلى أعوام من بدء تناول هذا العقار. في بعض الأحيان، لا تختفي هذه المشكلات وقد تتطور لتشكل خطراً على حياة المريض. قد تزداد فرص الإصابة بمشكلات في القلب إذا كنت تتناول عقاقير أخرى قد تتسبب مشكلات بالقلب أو إذا كنت قد أصبت من قبل بمشكلات في القلب أو تعرضت لإشعاع على منطقة الصدر، أو إذا تناولت هذا العقار من قبل أو عقاقير أخرى مماثلة. اسأل طبيبك إذا لم تكن متيقناً مما إذا كان أي من العقاقير التي تتناولها يتسبب في حدوث مشكلات بالقلب. تعتمد احتمالات إصابتك بمشكلات في القلب على كل من الجرعة التي تتناولها من هذا العقار وعلى المشكلة الصحية التي تعاني منها. وقد تتعرض لمشكلات في القلب حتى وإذا لم تكن لديك العوامل التي تشكل الخطورة. فيما يخص الأطفال، ترتفع فرص الإصابة بمشكلات في القلب في وقت لاحق من أعمارهم. اتصل بطبيبك على الفور إذا كنت تعاني من السعال، أو سرعة ضربات القلب أو بطئها، أو عدم انتظام ضربات القلب، أو تورم في الذراعين أو الساقين، أو ضيق التنفس، أو زيادة مفاجئة في الوزن أو الشعور بالتعب أو الضعف الشديد.

• حدثت آثار جانبية مثل القيء، أو ضيق التنفس، أو الأزيز، أو تورم الوجه، أو الصداع، أو القشعريرة، أو ألم الظهر، أو ضيق الصدر أو الحلق، أو حمى، أو سرعة ضربات القلب، أو حكة، أو زرقة الجلد أو اكتسابه اللون الرمادي، أو دوخة شديدة جداً، أو إغماء مع استعمال هذا العقار أثناء التسريب. في معظم الأحيان، حدثت هذه الآثار الجانبية مع التسريب الأول وتلاشى في غضون ساعات قليلة بعد توقف التسريب. وكانت ردود الفعل أحياناً بالغة الخطورة ومهددة للحياة أو مميتة. أخبر الطبيب فوراً إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض.

ما هي أوجه استعمال هذا الدواء؟

يُستخدم هذا العقار لعلاج السرطان.

ما الذي أحتاج أن أقوله لطبيبي قبل أن أتناول هذا العقار؟

• إذا كنت تعاني من حساسية تجاه الدوكسوروبيسين أو أي مشتق آخر من مشتقات هذا العقار.

• إذا كنت تعاني من الحساسية تجاه أي عقاقير مثل هذا العقار أو أي عقاقير أخرى، أو أطعمة أو أي مواد أخرى. أخبر طبيبك عن نوع الحساسية والعلامات التي ظهرت عليك مثل الطفح الجلدي أو الشرى أو الحكة أو ضيق النفس أو إحداث صوت صغير أثناء التنفس أو السعال أو تورم الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحلق أو أي علامات أخرى.

• إذا كنت ترضعين رضاعة طبيعية أو تخططين للإرضاع رضاعة طبيعية.

قد يتفاعل هذا العقار مع العقاقير الأخرى أو المشاكل الصحية الأخرى.

أخبر طبيبك والصيدلي الذي تتعامل معه عن كل العقاقير التي تتناولها (التي صُرفت بوصفة طبية أو العقاقير المتاحة دون وصفة طبية أو المنتجات الطبيعية أو الفيتامينات) ومشاكلك الصحية. يجب أن تراجع جميع العقاقير لتتحقق أنه يمكنك تناول هذا العقار بأمان إضافةً إلى جميع العقاقير التي تتعاطاها وفي وجود كل مشاكلك الصحية. تجنب البدء في تعاطي الجرعة من أي عقار أو إيقافها أو تغييرها دون الرجوع إلى طبيبك.

ما هي الاحتياطات التي ينبغي اتخاذها عند تناول هذا الدواء؟

• أخبر جميع مقدمي الرعاية الصحية لك بأنك تتناول هذا العقار. ومنهم الأطباء والمرضات والصيدلة وأطباء الأسنان المعالجين لك.

• عليك إجراء فحوصات دموية حسب تعليمات الطبيب. يرجى استشارة الطبيب.

• سيتعين عليك إجراء فحص للقلب قبل البدء في تناول هذا العقار. ويشمل ذلك تخطيط كهربية القلب (ECG). يرجى استشارة الطبيب.

• قد تزداد لديك فرصة الإصابة بالعدوى. اغسل يديك بكثرة. ابتعد عن المصابين بعدوى أو نزلات برد أو انفلونزا.

• قد تصاب بنزيف بسهولة أكثر. كن حريصاً، وتجنب الإصابة. ينبغي استعمال فرشاة أسنان ناعمة وماكيناة حلاقة كهربائية.

• استشر طبيبك إذا كنت تعاني من اضطراب في المعدة أو قيء أو سيولة في البراز (إسهال) أو عدم الشعور بالجوع. قد تكون هناك طرق لتقليل هذه الآثار الجانبية.

• للشفاء من قروح الفم، استخدم فرشاة أسنان ناعمة أو الماسحات القطنية ومضمض فمك. لا تستخدم مضمضة الفم التي يدخل الكحول في تركيبها.

• إذا سبق وتناولت daunorubicin (الداونوروبيسين) أو doxorubicin (الدوكسوروبيسين) أو epirubicin (الإبيوروبيسين) أو idarubicin (الإيداروبوسين) أو mitoxantrone (الميتوكسانترون)، فتحدث إلى طبيبك.

• قد يزيد هذا العقار من احتمال إصابتك ببعض أنواع السرطان. تحدث إلى الطبيب.

• حدثت حالات سرطان فم في الأشخاص الذين تناولوا هذا العقار لفترة طويلة (أكثر من عام). وحدثت أنواع السرطان هذه أثناء تقديم الرعاية بهذا العقار وما يصل إلى 6 سنوات من آخر جرعة. سيقوم الطبيب بفحص فمك أثناء العلاج بهذا العقار. اتصل بطبيبك فوراً إذا حدث تورم أو قرحات في الفم.

• تحدث إلى طبيبك قبل أن تأخذ أي لقاحات. استخدام هذا العقار قد يزيد من احتمال الإصابة بعدوى أو لا يُظهر مفعول اللقاح أيضاً.

• قد يؤثر هذا العقار في القدرة الإيجابية لدى الرجال. وقد يعود بعض الأشخاص إلى حالتهم الطبيعية، غير أن ذلك قد يستغرق بعض الوقت. استشر الطبيب.

• إذا كنت رجلاً وتمارس الجماع ويمكنك أن تحمل زوجتك، فاحرص على أن تجنبها الحمل خلال فترة الرعاية ولمدة 6 أشهر بعدها. وينبغي استعمال وسيلة منع حمل موثوق بها.

• إذا حملت زوجتك أثناء تناولك لهذا العقار أو خلال 6 أشهر من آخر جرعة تلقيتها، اتصل بطبيبك على الفور.

• قد تتوقف الدورة الشهرية لدى النساء اللاتي يعالجن هذا العقار. وقد لا تعود إلى طبيعتها. قد تتعرض النساء اللاتي يستخدمن هذا العقار كعلاج لانقطاع الطمث في سن أصغر من المعتاد. تحدث إلى طبيبك في هذا الأمر.

• قد يتسبب هذا العقار في مشكلات بالخصوبة. وقد يؤثر ذلك على القدرة على الإنجاب. تحدث إلى الطبيب.

• قد يتسبب هذا العقار في إلحاق ضرر بالجنين إذا تناولته وأنتِ حامل.

• استخدمي وسيلة من وسائل منع الحمل التي يمكنك الاعتماد عليها أثناء العلاج وبعد 6 شهر من انتهاء العلاج.

• في حالة حدوث حمل أثناء تناول هذا العقار أو خلال 6 أشهر بعد تناول آخر جرعة، اتصلي بطبيبك على الفور.

الأسباب الداعية للاتصال بأخصائي الرعاية الصحية على الفور.

تحذير/تنبيه: على الرغم من أن ذلك قد يكون نادراً، قد تظهر لدى بعض الأشخاص آثار جانبية سيئة للغاية وأحياناً آثار جانبية مميتة عند تناول أحد العقارات. أخبر طبيبك أو احصل على المساعدة الطبية على الفور إذا ظهرت لديك أي من العلامات أو الأعراض التالية والتي قد تكون مرتبطة بآثار جانبية سيئة للغاية:

• قد تحدث علامات على رد الفعل التحسسي، مثل الطفح الجلدي أو الشرى أو الحكة؛ أو احمرار البشرة أو تورمها أو انتشار البثور عليها أو تقشرها، ويصاحب ذلك حمى أو بدون حمى؛ أو إحداث صغير أثناء التنفس أو ضيق في الصدر أو الحلق، أو صعوبة في التنفس أو الكلام؛ أو حدوث بحة غير عادية أو تورم في الفم أو الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحلق.

• أعراض العدوى كالحمى، أو القشعريرة، أو التهاب شديد في الحلق، أو وجود ألم بالأذن أو الجيوب الأنفية، أو السعال، أو زيادة في البلغم أو تغير لونه، أو ألم عند التبول، أو وجود قروح بالفم، أو الإصابة بجرح لا يندمل.

• أعراض نزيف مثل قىء دم أو قيء يشبه ثفل القهوة؛ أو خروج دم في السعال؛ أو ظهور دم في البول؛ أو براز أسود أو أحمر أو قطراتي؛ أو نزيف من اللثة؛ أو نزيف مهبل غير طبيعي؛ أو ظهور كدمات بدون سبب أو زيادة حجمها؛ أو أي نزيف سيء للغاية أو لا يمكنك إيقافه.

• آلام أو ضعف الصدر.

• غثيان أو قيء شديد.

• فقدان وزن كثير.

• ألم العظام.

• العرق أثناء الليل.

• إحساس غير معتاد بالحرقة أو بالتنميل أو الوخز.

• احمرار أو تهيج راحة اليدين أو أخمص القدمين.

• التهاب الفم أو تقرحات بالفم.

• الشعور بالإرهاق أو الضعف الشديد.

• دم في البول.

• قد يؤدي هذا العقار إلى تهيج الوريد. قد يتسبب العقار في حدوث حروق في الجلد إذا تسرب من الوريد أثناء إعطائه. أخبر الممرضة إذا كنت مصاباً بأي احمرار أو حرقان أو آلام أو تورم أو تسرب للسائل من موضع سريان السائل إلى جسمك.

ما هي بعض الآثار الجانبية الأخرى لهذا العقار؟

جميع العقاقير قد تتسبب في آثار جانبية. ومع ذلك، فبعض الناس قد لا يصابون بأي من الآثار الجانبية أو قد يصابون ببعض الآثار الجانبية البسيطة. تحدث إلى طبيبك أو احصل على المساعدة الطبية إذا أزعجتك أو لم تختفي أي من هذه الآثار الجانبية أو أي آثار جانبية أخرى:

• الشعور بالإرهاق أو الضعف.

• الإمساك.

• الإسهال أو البراز المتقفل.

• اضطراب المعدة أو قيء.

• عدم الشعور بالجوع.

• ألم في الظهر.

• الصداع.

• تساقط الشعر.

• تهيج الحلق.

• فقد الوزن.

• قد يتغير لون البول وأي من سوائل الجسم الأخرى للون البرتقالي أو الأحمر. هذا أمر طبيعي.

هذه ليست جميع الآثار الجانبية التي قد تقع. إذا راودتك أي أسئلة عن الأعراض الجانبية، اتصل بطبيبك. استشر طبيبك للحصول على المشورة الطبية بخصوص الآثار الجانبية. يمكنك الإبلاغ عن الآثار الجانبية إلى وكالة الصحة المحلية لديك.

ما هي أفضل طريقة لتناول الدواء؟

تناول هذا العقار حسبما أمر طبيبك. واقرأ جميع المعلومات المقدمة لك. واتبع كافة الإرشادات بعناية.

يتم إعطاء هذا الدواء كحقن في الوريد على مدى فترة معينة من الوقت.

احرص على تناول كمية كبيرة من السوائل الخالية من مادة الكافيين ما لم ينصحك الطبيب بتناول كمية أقل.

ماذا أفعل إذا فاتتني إحدى الجرعات؟

اتصل بطبيبك لمعرفة ما يتعين عليك فعله.

كيف يتم تخزين هذا الدواء؟

إذا كنت تريد تخزين هذا العقار في المنزل، فحدث إلى طبيبك أو الممرضة أو الصيدلي حول كيفية تخزينه.

إرشادات عامة

إذا لم تتحسن الأعراض أو المشاكل الصحية التي تعاني منها أو إذا ازدادت سوءاً، اتصل بطبيبك.

يحظر مشاركة العقاقير التي تتناولها مع أشخاص آخرين، ويحظر كذلك تناول أي عقاقير خاصة بشخص آخر.

احتفظ بقائمة بالعقاقير (الوصفات الطبية والمستحضرات الطبيعية والفيتامينات والعقاقير المتاحة بدون وصفة طبية) الخاصة بك. قدم هذه القائمة لطبيبك.

يرجى استشارة الطبيب قبل البدء في استخدام أي عقار جديد، وذلك يتضمن العقاقير المتاحة بوصفة أو بدون وصفة طبية أو المستحضرات الطبيعية أو الفيتامينات.

احتفظ بجميع العقاقير في مكان آمن. احتفظ بجميع العقاقير بعيداً عن تناول الأطفال والحيوانات الأليفة.

استشر الصيدلي بخصوص كيفية التخلص من العقاقير غير المستخدمة.

بعض العقاقير قد تحتوي على نشرة معلومات مريض مختلفة. إذا كانت لديك أية أسئلة عن هذا العقار، يرجى استشارة الطبيب أو الممرض أو الصيدلي الخاص بك أو غيرهم من مقدمي الرعاية الصحية.

إذا اعتقدت أنك تناولت جرعة زائدة، اتصل بمركز مكافحة السموم لديك أو احصل على الرعاية الطبية على الفور. كن جاهزاً لعرض أو الإبلاغ عن ما تتناوله وكميته ومتى حدث ذلك.

استخدام معلومات المستهلك وإخلاء المسؤولية: لا ينبغي استخدام هذه المعلومات بغرض تحديد تناول هذا الدواء أو أي دواء آخر من عدمه. فمقدم الرعاية الصحية هو وحده من لديه من المعرفة والتدريب ما يتيح له تحديد أي الأدوية تناسب مريضاً بعينه. هذه المعلومات لا تميز أي دواء باعتباره آمناً أو فعالاً أو معتمداً لعلاج أي مريض أو أي حالة صحية. هذا ليس إلا ملخصاً موجزاً لمعلومات عامة عن هذا الدواء فحسب. وهو لا يشمل مطلقاً كل المعلومات المتعلقة بالاستخدامات أو الإرشادات أو التحذيرات أو الاحتياطات أو التفاعلات أو الآثار الضارة أو المخاطر المحتملة التي قد تنطبق على هذا الدواء. هذه المعلومات ليست عبارة عن نصيحة طبية محددة ولا تحل محل المعلومات التي تحصل عليها من مقدم الرعاية الصحية الذي تتبناه. يجب أن تستشير مقدم الرعاية الصحية الذي تتبناه بخصوص المعلومات الكاملة عن مخاطر استخدام هذا الدواء وفوائده.

Last Updated 3/20/17

