

النطق

(den OH sue mab)

أسماء العلامات التجارية الأمريكية

- Prolia
- Xgeva

أسماء العلامات التجارية الكندية

- Prolia
- Xgeva

ما هي أوجه استعمال هذا الدواء؟

- يُستخدم هذا العقار لعلاج تخلخل وترقق العظام (هشاشة العظام).
- يُستخدم هذا العقار لنمو العظام.
- يستخدم هذا الدواء في علاج عدة أنواع من السرطان.
- يُستخدم لعلاج ارتفاع مستويات الكالسيوم لدى مرضى السرطان.
- وقد يتم وصفه لك لأسباب أخرى. يُرجى استشارة الطبيب.

ما الذي أحتاج أن أقوله لطبيبي قبل أن أتناول هذا العقار؟

- إذا كنت تعاني من أي حساسية مفرطة ضد عقار الدنوسوماب أو أي من مكوناته الأخرى.
- إذا كنت تعاني من الحساسية تجاه أي عقاقير مثل هذا العقار أو أي عقاقير أخرى، أو أطعمة أو أي مواد أخرى. أخبر طبيبك عن نوع الحساسية والعلامات التي ظهرت عليك مثل الطفح الجلدي أو الشرى أو الحكة أو ضيق النفس أو إحداث صوت صفير أثناء التنفس أو السعال أو تورم الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحلق أو أي علامات أخرى.
- إذا كنت تعاني من انخفاض معدلات الكالسيوم.
- إذا كنت ترضعين رضاعة طبيعية أو تخططين للإرضاع رضاعة طبيعية.
- إذا كنتِ حاملاً أو من المحتمل كونك حاملاً. يحظر استخدام بعض العلامات التجارية لهذا العقار أثناء الحمل.
- هذه ليست قائمة بكل العقاقير أو المشاكل الصحية التي تتفاعل مع هذا العقار.
- أخبر طبيبك والصيدلي الذي تتعامل معه عن كل العقاقير التي تتناولها (التي صُرفت بوصفة طبية أو العقاقير المتاحة دون وصفة طبية أو المنتجات الطبيعية أو الفيتامينات) ومشاكلك الصحية. يجب أن تراجع جميع العقاقير لتتحقق أنه يمكنك تناول هذا العقار بأمان إضافةً إلى جميع العقاقير التي تتعاطاها وفي وجود كل مشاكلك الصحية. تجنب البدء في تعاطي الجرعة من أي عقار أو إيقافها أو تغييرها دون الرجوع إلى طبيبك.

ما هي الاحتياطات التي ينبغي اتخاذها عند تناول هذا الدواء؟

جميع الأشكال:

- أخبر جميع مقدمي الرعاية الصحية لك بأنك تتناول هذا العقار. ومنهم الأطباء والممرضات والصيدالدة وأطباء الأسنان المعالجين لك.
- قد يزيد هذا العقار من فرص التعرض لكسر بالساق. استشر الطبيب.
- عليك إجراء فحوصات دموية حسب تعليمات الطبيب. يرجى استشارة الطبيب.
- احرص على عمل فحص كثافة العظام وفق تعليمات طبيبك. استشر الطبيب.
- تناول الكالسيوم وفيتامين د وفقاً لتوجيهات طبيبك.
- افحص أسنانك قبل بدء تناول هذا الدواء.
- اعتن بأسنانك. مع الذهاب إلى طبيب الأسنان بشكل دوري.

• إذا كنت من المدخنين، فاستشر أخصائي الرعاية الطبية.

• استشر طبيبك إذا كنت مريضاً وزوجتك حاملاً أو ستحمل في أي وقت أثناء فترة علاجك.

• قد يتسبب هذا العقار في إلحاق ضرر بالجنين إذا تناولته وأنت حامل.

إكسجيفا®:

• ينبغي استخدام وسيلة منع حمل موثوق بها أثناء تناول هذا العقار ولمدة 5 أشهر بعد إيقاف تناوله.

• في حالة حدوث حمل أثناء تناول هذا العقار أو خلال 5 أشهر بعد تناول آخر جرعة، اتصلي بالطبيب فوراً.

بروليا TM:

• تم تسجيل حالات عدوى خطيرة إثر استخدام هذا العقار. إذا أصبت بأي عدوى أو كنت تتناول مضادات حيوية في الوقت الراهن أو في الماضي القريب أو أصبت بأكثر من عدوى، فاستشر طبيبك.

• قد تزداد لديك فرصة الإصابة بالعدوى. اغسل يديك بكثرة. ابتعد عن المصابين بعدوى أو نزلات برد أو انفلونزا.

• قد يؤدي هذا العقار إلى خفض مستويات الكالسيوم في الدم. وإذا كنت تعاني بالفعل من انخفاض مستوى الكالسيوم في الدم، فقد يتفاقم بتناول هذا العقار. وفي بعض الأحيان، تظل مستويات الكالسيوم في الدم منخفضة لعدة أسابيع أو أشهر بعد استخدام هذا العقار. استشر الطبيب.

• بعد التوقف عن استخدام هذا العقار، تزداد احتمالية انكسار العظام. ويشمل ذلك العظام الموجودة داخل العمود الفقري. وتزداد احتمالية انكسار أكثر من عظمة داخل العمود الفقري وذلك إذا سبق حدوث انكسار عظمة واحدة داخل عمودك الفقري. لا توقف العلاج بهذا العقار دون استشارة طبيبك.

• ينبغي استعمال وسيلة موثوق فيها لمنع الحمل أثناء تناول هذا العقار.

• إذا كنتِ حاملاً أو أصبحتِ حاملاً أثناء تناول هذا العقار، اتصلي بطبيبك على الفور.

الأسباب الداعية للاتصال بأخصائي الرعاية الصحية على الفور.

تحذير/تنبيه: على الرغم من أن ذلك قد يكون نادراً، قد تظهر لدى بعض الأشخاص آثار جانبية سيئة للغاية وأحياناً آثار جانبية مميتة عند تناول أحد العقارات. اخبر طبيبك أو احصل على المساعدة الطبية على الفور إذا ظهرت لديك أي من العلامات أو الأعراض التالية والتي قد تكون مرتبطة بآثار جانبية سيئة للغاية:

جميع الأشكال:

• قد تحدث علامات على رد الفعل التحسسي، مثل الطفح الجلدي أو الشرى أو الحكة؛ أو احمرار البشرة أو تورمها أو انتشار البثور عليها أو تقشرها، وبصاحب ذلك حمى أو بدون حمى؛ أو إحداث صغير أثناء التنفس أو ضيق في الصدر أو الحلق، أو صعوبة في التنفس أو الكلام؛ أو حدوث بحة غير عادية أو تورم في الفم أو الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحلق.

• علامات انخفاض مستويات الكالسيوم مثل تقلص أو تشنج العضلات أو تميل أو وخز أو نوبات صرع.

• بثرات الفم.

• تورم بالأذرع أو الأرجل.

• الشعور بالإرهاق أو الضعف الشديد.

• ألم جديد أو غريب في منطقة الأربية أو الورك أو الفخذ.

• ألم شديد في العظام أو المفاصل أو العضلات.

• قد يتسبب هذا العقار في ظهور مشكلات بعظام الفك. وكلما طال استخدامك لهذا العقار زادت فرص إصابتك بهذه المشكلات. وقد تزداد فرص الإصابة إذا كنت تعاني من السرطان أو مشكلات في الأسنان أو تستخدم أطعم أسنان غير منطوقة، أو تعاني من الأنيميا أو مشكلات تجلط الدم أو عدوى. وقد تزداد فرص الإصابة أيضاً إذا كنت تخضع لعلاج للأسنان، أو لعلاج كيميائي أو إشعاعي، أو تتناول عقاقير أخرى قد تؤدي إلى حدوث مشكلات بعظام الفك مثل تناول بعض العقاقير الأستيرويدية. وتوجد عدة عقاقير قد تسبب في حدوث ذلك. استشر الطبيب أو الصيدلي الخاص بك إذا لم تكن متأكدًا. واتصل بطبيبك فوراً إذا أصبت بتورم أو ألم بالفك.

إكسجيفا®:

• ألم أو الضعف الشديد في العضلات.

• نوبات مرضية.

• ضيق التنفس.

• حدثت حالات ارتفاع مستويات الكالسيوم بعد التوقف عن هذا العقار لدى المرضى الذين لا تزال عظامهم في مرحلة النمو. اتصل بطبيبك على الفور إذا ظهرت عليك علامات تشير إلى ارتفاع مستويات الكالسيوم مثل الضعف، أو التشوش، أو الإحساس بالإرهاق، أو الصداع، أو اضطراب المعدة أو القيء، أو الإمساك، أو ألم في العظام.

بروليا TM:

• أعراض العدوى كالحمى، أو القشعريرة، أو التهاب شديد في الحلق، أو وجود ألم بالأذن أو الجيوب الأنفية، أو السعال، أو زيادة في البلغم أو تغير لونه، أو ألم عند التبول، أو وجود قروح بالفم، أو الإصابة بجرح لا يندمل.

• علامات وجود مشكلة في البنكرياس (التهاب البنكرياس) مثل ألم شديد جداً في المعدة أو ألم شديد جداً في الظهر أو اضطراب شديد جداً في المعدة أو قيء.

• ألم في الصدر.

• عدم انتظام ضربات القلب.

• تهيج شديد للجلد.

• آلام المثانة أو ألم عند التبول أو تغير في كمية البول.

• زيادة مرات التبول.

ما هي بعض الآثار الجانبية الأخرى لهذا العقار؟

جميع العقاقير قد تتسبب في آثار جانبية. ومع ذلك، فبعض الناس قد لا يصابون بأي من الآثار الجانبية أو قد يصابون ببعض الآثار الجانبية البسيطة. تحدث إلى طبيبك أو احصل على المساعدة الطبية إذا أزعجتك أو لم تختفي أي من هذه الآثار الجانبية أو أي آثار جانبية أخرى:

جميع الأشكال:

• ألم في الظهر.

اكسجيفا®:

• الإمساك.

• عدم الشعور بالجوع.

• ألم في المفاصل.

• الشعور بالإرهاق أو الضعف.

• الصداع.

• اضطراب المعدة أو قيء.

• الإسهال أو البراز المتقلقل.

بروليا TM:

• آلام في العضلات أو المفاصل.

• التهاب الحلق.

• رشح الأنف.

• آلام في الذراعين والساقين.

هذه ليست جميع الآثار الجانبية التي قد تقع. إذا راودتك أي أسئلة عن الأعراض الجانبية، اتصل بطبيبك. استشر طبيبك للحصول على المشورة الطبية بخصوص الآثار الجانبية. يمكنك الإبلاغ عن الآثار الجانبية إلى وكالة الصحة المحلية لديك.

ما هي أفضل طريقة لتناول الدواء؟

تناول هذا العقار حسبما أمر طبيبك. واقرأ جميع المعلومات المقدمة لك. واتبع كافة الإرشادات بعناية.

• يعطى العقار كحقنة في إحدى مناطق الجلد المليئة بالدهون.

ماذا أفعل إذا فاتتني إحدى الجرعات؟

• اتصل بطبيبك لمعرفة ما يتعين عليك فعله.

كيف يتم تخزين هذا الدواء؟

• إذا كنت تريد تخزين هذا العقار في المنزل، فتحدث إلى طبيبك أو الممرضة أو الصيدلي حول كيفية تخزينه.

إرشادات عامة

• إذا لم تتحسن الأعراض أو المشاكل الصحية التي تعاني منها أو إذا ازدادت سوءًا، اتصل بطبيبك.

• يحظر مشاركة العقاقير التي تتناولها مع أشخاص آخرين، ويحظر كذلك تناول أي عقاقير خاصة بشخص آخر.

• احتفظ بقائمة بالعقاقير (الوصفات الطبية والمستحضرات الطبيعية والفيتامينات والعقاقير المتاحة بدون وصفة طبية) الخاصة بك. قدم هذه القائمة لطبيبك.

• يرجى استشارة الطبيب قبل البدء في استخدام أي عقار جديد، وذلك يتضمن العقاقير المتاحة بوصفة أو بدون وصفة طبية أو المستحضرات الطبيعية أو الفيتامينات.

• احتفظ بجميع العقاقير في مكان آمن. احتفظ بجميع العقاقير بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.

• استشر الصيدلي بخصوص كيفية التخلص من العقاقير غير المستخدمة.

• بعض العقاقير قد تحتوي على نشرة معلومات مريض مختلفة. إذا كانت لديك أية أسئلة عن هذا العقار، يرجى استشارة الطبيب أو الممرض أو الصيدلي الخاص بك أو غيرهم من

مقدمي الرعاية الصحية.

• إذا اعتقدت أنك تناولت جرعة زائدة، اتصل بمركز مكافحة السموم لديك أو احصل على الرعاية الطبية على الفور. كن جاهزًا لعرض أو الإخبار عن ما تتناوله وكميته ومتى حدث

ذلك.

استخدام معلومات المستهلك وإخلاء المسؤولية: لا ينبغي استخدام هذه المعلومات بغرض تحديد تناول هذا الدواء أو أي دواء آخر من عدمه. فمقدم الرعاية الصحية هو وحده من لديه من المعرفة والتدريب ما يتيح له تحديد أي الأدوية تناسب مريضًا بعينه. هذه المعلومات لا تجيز أي دواء باعتباره آمنًا أو فعالًا أو معتمدًا لعلاج أي مريض أو أي حالة صحية. هذا ليس إلا ملخصًا موجزًا للمعلومات عامة عن هذا الدواء فحسب. وهو لا يشمل مطلقًا كل المعلومات المتعلقة بالاستخدامات أو الإرشادات أو التحذيرات أو الاحتياطات أو التفاعلات أو الآثار الضارة أو المخاطر المحتملة التي قد تنطبق على هذا الدواء. هذه المعلومات ليست عبارة عن نصيحة طبية محددة ولا تحل محل المعلومات التي تحصل عليها من مقدم الرعاية الصحية الذي تتبعه. يجب أن تستشير مقدم الرعاية الصحية الذي تتبعه بخصوص المعلومات الكاملة عن مخاطر استخدام هذا الدواء وقوائمه.

Last Updated 5/3/17



حقوق التأليف والنشر © 2017 مملوكة لشركة Wolters Kluwer Clinical Drug Information, Inc. والشركات التابعة لها ولأو مانحي التراخيص. جميع الحقوق محفوظة.