

النطق

(doe se TAKS el)

أسماء العلامات التجارية الأمريكية

- [Docefrez [DSC
- Taxotere

أسماء العلامات التجارية الكندية

- Docetaxel for Injection
- Docetaxel Injection
- Taxotere

تحذير

• لقد حدث رد فعلي تحسسي خطير وأحياناً مميت عند استخدام هذا العقار. لا تتناول هذا العقار إذا تعرضت من قبل لرد فعل تحسسي تجاه هذا العقار أو أي عقاقير أخرى تحتوي على بوليسوربيت 80.

• نادراً ما يزداد خطر التعرض للوفاة عند استخدام هذا العقار لدى الأشخاص ممن لديهم مشكلات في الكبد ولدى الأشخاص الذين يتناولون جرعات عالية من هذا العقار. ويزداد الخطر كذلك لدى الأشخاص المصابين بنوع معين من سرطان الرئة ممن خضعوا للعلاج باستخدام العلاج الكيميائي المعتمد على البلاتين. يُحظر تناول هذا العقار إذا كنت تعاني من مرض في الكبد. تحدث إلى طبيبك في هذا الأمر.

• قد يتسبب هذا العقار في تورم أجزاء الجسم أو الحفاظ على السوائل داخل الجسم. أخبر طبيبك المعالج إذا كنت تعاني من تورم أو زيادة في الوزن أو صعوبة في التنفس.

• قد يقلل هذا العقار من قدرة نخاع العظام لديك على صنع خلايا الدم التي يحتاجها جسمك. وقد يؤدي ذلك إلى ضرورة نقل الدم وحدوث مشكلات نزيف أو حالات عدوى بالغة السوء ومميتة أحياناً. أخبر طبيبك فوراً إذا ظهرت لديك علامات العدوى مثل الحمى أو القشعريرة أو التهاب الحلق أو أي كدمات أو نزيف أو شعور بالإرهاق أو الضعف الشديد.

• لا تتناول هذا العقار إذا انخفضت عدد خلايا الدم البيضاء لديك.

• عليك إجراء فحوصات دموية حسب تعليمات الطبيب. يرجى استشارة الطبيب.

ما هي أوجه استعمال هذا الدواء؟

• يُستخدم هذا العقار لعلاج السرطان.

ما الذي أحتاج أن أقوله لطبيبي قبل أن أتناول هذا العقار؟

• إذا كنت تعاني من حساسية تجاه الدوكيتاكسيل أو أي مشتق آخر من مشتقات هذا العقار.

• إذا كنت تعاني من الحساسية تجاه أي عقاقير مثل هذا العقار أو أي عقاقير أخرى، أو أطعمة أو أي مواد أخرى. أخبر طبيبك عن نوع الحساسية والعلامات التي ظهرت عليك مثل الطفح الجلدي أو الشرى أو الحكة أو ضيق النفس أو إحداث صوت صغير أثناء التنفس أو السعال أو تورم الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحلق أو أي علامات أخرى.

• إذا كنت ترضعين رضاعة طبيعية أو تخططين للإرضاع رضاعة طبيعية.

قد يتفاعل هذا العقار مع العقاقير الأخرى أو المشاكل الصحية الأخرى.

أخبر طبيبك والصيدلي الذي تتعامل معه عن كل العقاقير التي تتناولها (التي صُرفت بوصفة طبية أو العقاقير المتاحة دون وصفة طبية أو المنتجات الطبيعية أو الفيتامينات) ومشاكلك الصحية. يجب أن تراجع جميع العقاقير لتتحقق أنه يمكنك تناول هذا العقار بأمان إضافةً إلى جميع العقاقير التي تتعاطاها وفي وجود كل مشاكلك الصحية. تجنب البدء في تعاطي الجرعة من أي عقار أو إيقافها أو تغييرها دون الرجوع إلى طبيبك.

ما هي الاحتياطات التي ينبغي اتخاذها عند تناول هذا الدواء؟

جميع الأشكال:

- أخبر جميع مقدمي الرعاية الصحية لك بأنك تتناول هذا العقار. ومنهم الأطباء والمرضات والصيادلة وأطباء الأسنان المعالجين لك.
- قد تزداد لديك فرصة الإصابة بالعدوى. اغسل يديك بكثرة. ابتعد عن المصابين بعدوى أو نزلات برد أو انفلونزا.
- استشر طبيبك إذا كنت تعاني من اضطراب في المعدة أو قيء أو سيولة في البراز (إسهال) أو عدم الشعور بالجوع. قد تكون هناك طرق لتقليل هذه الآثار الجانبية.
- من الممكن أن يبدأ طبيبك في إعطائك عقار لعلاج التورم.
- تحدث إلى طبيبك قبل أن تأخذ أي لقاحات. استخدام هذا العقار قد يزيد من احتمال الإصابة بعدوى أو لا يُظهر مفعول اللقاح أيضاً.
- قد تصاب بنزيف بسهولة أكثر. كن حريصاً، وتجنب الإصابة. ينبغي استعمال فرشاة أسنان ناعمة وماكيناة حلاقة كهربائية.
- قد يزيد هذا العقار من احتمال إصابتك ببعض أنواع السرطان. تحدث إلى الطبيب.
- يعد تساقط الشعر شائعاً عند تناول هذا العقار. وفي كثير من الأحيان، يتراجع النمو الطبيعي للشعر. أحياناً، قد لا يعود نمو الشعر إلى طبيعته. استشر الطبيب.
- إذا كنت تبلغ من العمر 65 عاماً أو أكثر، فيرجى استعمال هذا الدواء مع توخي الحذر. فقد يؤدي ذلك إلى ظهور مزيد من الأعراض الجانبية.
- قد يتسبب هذا العقار في إلحاق ضرر بالجنين إذا تناولته وأنتِ حامل. وإذا كنتِ حاملاً أو أصبحتِ حاملاً أثناء تناول هذا العقار، اتصلي بطبيبك على الفور.
- ينبغي استعمال وسيلة موثوق فيها لمنع الحمل أثناء تناول هذا العقار.

المنتجات التي تحتوي على الكحول:

- تجنب قيادة السيارة أو القيام بمهام أو أنشطة أخرى تستوجب أن تكون مُنتبهاً لمدةٍ من ساعة إلى ساعتين بعد تناول هذا العقار وحتى تدرِك مدى تأثير هذا العقار عليك.
- يحتوي هذا العقار على الكحول. قد يتسبب هذا في أن تشعر بالثمالة أثناء العلاج وبعده. أخبر طبيبك إذا شعرت بالارتباك أو الثمالة أو التعتُّر أو النعاس الشديد أثناء العلاج، أو خلال ساعة إلى ساعتين بعد العلاج.
- أخبر الطبيب قبل تعاطي كحوليات أو عقاقير أو منتجات طبيعية تبطن من أفعالك.

الأسباب الداعية للاتصال بأخصائي الرعاية الصحية على الفور.

- **تحذير/تنبيه:** على الرغم من أن ذلك قد يكون نادراً، قد تظهر لدى بعض الأشخاص آثار جانبية سيئة للغاية وأحياناً آثار جانبية مميّنة عند تناول أحد العقارات. أخبر طبيبك أو حصل على المساعدة الطبية على الفور إذا ظهرت لديك أي من العلامات أو الأعراض التالية والتي قد تكون مرتبطة بآثار جانبية سيئة للغاية:
- قد تحدث علامات على رد الفعل التحسسي، مثل الطفح الجلدي أو الشرى أو الحكة؛ أو احمرار البشرة أو تورمها أو انتشار البثور عليها أو تقشرها، وبصاحب ذلك حمى أو بدون حمى؛ أو إحداث صغير أثناء التنفس أو ضيق في الصدر أو الحلق، أو صعوبة في التنفس أو الكلام؛ أو حدوث بحة غير عادية أو تورم في الفم أو الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحلق.
- أعراض العدوى كالحُمى، أو القشعريرة، أو التهاب شديد في الحلق، أو وجود ألم بالأذن أو الجيوب الأنفية، أو السعال، أو زيادة في البلغم أو تغير لونه، أو ألم عند التبول، أو وجود قروح بالفم، أو الإصابة بجرح لا يندمل.
- أعراض نزيف مثل قيء دم أو قيء يشبه ثفل القهوة؛ أو خروج دم في السعال؛ أو ظهور دم في البول؛ أو براز أسود أو أحمر أو قطراني؛ أو نزيف من اللثة؛ أو نزيف مهبل غير طبيعي؛ أو ظهور كدمات بدون سبب أو زيادة حجمها؛ أو أي نزيف سيء للغاية أو لا يمكنك إيقافه.
- علامات وجود مشاكل الكبد مثل بول داكن اللون أو الشعور بالإرهاق أو عدم الشعور بالجوع أو اضطراب في المعدة أو ألم في المعدة أو براز فاتح اللون أو قيء أو اصفرار لون الجلد أو العيون.
- ضيق التنفس أو زيادة كبيرة في الوزن أو تورم في الذراعين أو الساقين.
- دوام شديد أو إغماء.
- غثيان أو قيء شديد.
- إحساس غير معتاد بالحرقة أو بالتميل أو الوخز.
- الشعور بالإرهاق أو الضعف الشديد.
- آلام أو ضغط في الصدر أو تسارع في ضربات القلب.
- عدم انتظام ضربات القلب.
- صداع شديد.
- آلام في العضلات.
- قد يسبب هذا العقار تلفاً في الأنسجة إذا تسرّب العقار من الوريد. أخبر الممرضة إذا أصبت بأي احمرار أو حرقان أو آلام أو تورم أو في حالة ظهور نطفات على الجلد أو تسرب للسائل من موضع سريانه إلى جسمك.
- قد يسبب هذا العقار مشكلة معينة بالعينين يطلق عليها وذمة البقعة الكيسية (CME). قد تحتاج إلى إجراء فحوصات على العينين في حالة استخدام هذا العقار. اتصل بطبيبك على الفور في حالة تغير الرؤية مثل عدم وضوحها أو فقدان الإبصار.

ما هي بعض الآثار الجانبية الأخرى لهذا العقار؟

- جميع العقاقير قد تتسبب في آثار جانبية. ومع ذلك، فبعض الناس قد لا يصابون بأي من الآثار الجانبية أو قد يصابون ببعض الآثار الجانبية البسيطة. تحدث إلى طبيبك أو حصل على المساعدة الطبية إذا أزعجتك أو لم تختفي أي من هذه الآثار الجانبية أو أي آثار جانبية أخرى:

- اضطراب المعدة أو قيء.
- الإسهال أو البراز المتقلقل.
- التهاب الفم أو تقرحات بالفم.
- الشعور بالإرهاق أو الضعف.
- تساقط الشعر.
- تغيير في الأظافر.
- تغيير في القدرة على التذوق.
- الإمساك.
- عدم الشعور بالجوع.
- ألم في المفاصل.
- احمرار العين.
- التُّماع.

هذه ليست جميع الآثار الجانبية التي قد تقع. إذا راودتك أي أسئلة عن الأعراض الجانبية، اتصل بطبيبك. استشر طبيبك للحصول على المشورة الطبية بخصوص الآثار الجانبية. يمكنك الإبلاغ عن الآثار الجانبية إلى وكالة الصحة المحلية لديك.

ما هي أفضل طريقة لتناول الدواء؟

تناول هذا العقار حسبما أمر طبيبك. وقرأ جميع المعلومات المقدمة لك. واتبع كافة الإرشادات بعناية.

يتم إعطاء هذا الدواء كحقن في الوريد على مدى فترة معينة من الوقت.

سيتم إعطاء أحد عقاقير الستيرويد مثل ديكساميثازون (dexamethasone) قبل هذا العقار لتقليل الآثار الجانبية. لذا يرجى استشارة الطبيب في هذا الأمر. اخبر الطبيب إذ لم يتم استعمال عقار الستيرويد حسب تعليمات الطبيب.

ماذا أفعل إذا فاتتني إحدى الجرعات؟

اتصل بطبيبك لمعرفة ما يتعين عليك فعله.

كيف يتم تخزين هذا الدواء؟

إذا كنت تريد تخزين هذا العقار في المنزل، فتحدث إلى طبيبك أو الممرضة أو الصيدلي حول كيفية تخزينه.

إرشادات عامة

إذا لم تتحسن الأعراض أو المشاكل الصحية التي تعاني منها أو إذا ازدادت سوءاً، اتصل بطبيبك.

يحظر مشاركة العقاقير التي تتناولها مع أشخاص آخرين، ويحظر كذلك تناول أي عقاقير خاصة بشخص آخر.

احتفظ بقائمة بالعقاقير (الوصفات الطبية والمستحضرات الطبيعية والفيتامينات والعقاقير المتاحة بدون وصفة وطبية) الخاصة بك. قدم هذه القائمة لطبيبك.

يرجى استشارة الطبيب قبل البدء في استخدام أي عقار جديد، وذلك يتضمن العقاقير المتاحة بوصفة أو بدون وصفة طبية أو المستحضرات الطبيعية أو الفيتامينات.

احتفظ بجميع العقاقير في مكان آمن. احتفظ بجميع العقاقير بعيداً عن تناول الأطفال والحيوانات الأليفة.

استشر الصيدلي بخصوص كيفية التخلص من العقاقير غير المستخدمة.

بعض العقاقير قد تحتوي على نشرة معلومات مريض مختلفة. إذا كانت لديك أية أسئلة عن هذا العقار، يرجى استشارة الطبيب أو الممرض أو الصيدلي الخاص بك أو غيرهم من مقدّمي الرعاية الصحية.

إذا اعتقدت أنك تناولت جرعة زائدة، اتصل بمركز مكافحة السموم لديك أو حصل على الرعاية الطبية على الفور. كن جاهزاً لعرض أو الإخبار عن ما تتناوله وكميته ومتى حدث ذلك.

استخدام معلومات المستهلك وإخلاء المسؤولية: لا ينبغي استخدام هذه المعلومات بغرض تحديد تناول هذا الدواء أو أي دواء آخر من عدمه. فمقدم الرعاية الصحية هو وحده من لديه من المعرفة والتدريب ما يتيح له تحديد أي الأدوية تناسب مريضاً بعينه. هذه المعلومات لا تحيز أي دواء باعتباره آمناً أو فعالاً أو معتمداً لعلاج أي مريض أو أي حالة صحية. هذا ليس إلا ملخصاً موجزاً لمعلومات عامة عن هذا الدواء فحسب. وهو لا يشمل مطلقاً كل المعلومات المتعلقة بالاستخدامات أو الإرشادات أو التحذيرات أو الاحتياطات أو التفاعلات أو الآثار الضارة أو المخاطر المحتملة التي قد تنطبق على هذا الدواء. هذه المعلومات ليست عبارة عن نصيحة طبية محددة ولا تحل محل المعلومات التي تحصل عليها من مقدم الرعاية الصحية الذي تتبعه. يجب أن تستشير مقدم الرعاية الصحية الذي تتبعه بخصوص المعلومات الكاملة عن مخاطر استخدام هذا الدواء وفوائده.

