

النطق

(doks oh ROO bi sin con VEN sha nal)

أسماء العلامات التجارية الأمريكية

• Adriamycin

أسماء العلامات التجارية الكندية

- Adriamycin PFS
- Doxorubicin Hydrochloride For Injection, USP
- Doxorubicin Hydrochloride Injection

تحذير

• قد يتسبب هذا العقار في ظهور مشكلات خطيرة للغاية في القلب مثل قصور القلب. قد يحدث هذا الأمر أثناء العلاج أو خلال فترة تمتد من شهر إلى أعوام من بدء تناول هذا العقار. في بعض الأحيان، لا تختفي هذه المشكلات وقد تتطور لتشكل خطراً على حياة المريض. قد تزداد فرص الإصابة بمشكلات في القلب إذا كنت تتناول عقاقير أخرى قد تتسبب مشكلات بالقلب أو إذا كنت قد أصبت من قبل بمشكلات في القلب أو تعرضت لإشعاع على منطقة الصدر، أو إذا تناولت هذا العقار من قبل أو عقاقير أخرى مماثلة. اسأل طبيبك إذا لم تكن متيقناً مما إذا كان أي من العقاقير التي تتناولها يتسبب في حدوث مشكلات بالقلب. تعتمد احتمالات إصابتك بمشكلات في القلب على كل من الجرعة التي تتناولها من هذا العقار وعلى المشكلة الصحية التي تعاني منها. وقد تتعرض لمشكلات في القلب حتى وإذا لم تكن لديك العوامل التي تشكل الخطورة. فيما يخص الأطفال، ترتفع فرص الإصابة بمشكلات في القلب في وقت لاحق من أعمارهم. اتصل بطبيبك على الفور إذا كنت تعاني من السعال، أو سرعة ضربات القلب أو بطئها، أو عدم انتظام ضربات القلب، أو تورم في الذراعين أو الساقين، أو ضيق التنفس، أو زيادة مفاجئة في الوزن أو الشعور بالتعب أو الضعف الشديد.

• قد يقلل هذا العقار من قدرة نخاع العظام لديك على صنع خلايا الدم التي يحتاجها جسمك. وقد يؤدي ذلك إلى ضرورة نقل الدم وحدث مشكلات نزيف أو حالات عدوى بالغة السوء ومميّزة أحياناً. أخبر طبيبك فوراً إذا ظهرت لديك علامات العدوى مثل الحمى أو القشعريرة أو التهاب الحلق أو أي كدمات أو نزيف أو شعور بالإرهاق أو الضعف الشديد.

• إذا كنت تعاني من مرض بالكبد، فربما تحتاج إلى تناول جرعة أقل. استشر طبيبك.

• قد يظهر خطر التعرض لمشكلة خطيرة في نخاع العظم وسرطان ثانوي (نوع من سرطان الدم) بعد المداواة باستخدام هذا العقار. استشر الطبيب.

• قد يسبب هذا العقار تلفاً في الأنسجة إذا تسرب العقار من الوريد. أخبر الممرضة إذا أصبت بأي احمرار أو حرقان أو آلام أو تورم أو في حالة ظهور نفايات على الجلد أو تسرب للسائل من موضع سريانه إلى جسمك.

ما هي أوجه استعمال هذا الدواء؟

• يُستخدم هذا العقار لعلاج السرطان.

ما الذي أحتاج أن أقوله لطبيبي قبل أن أتناول هذا العقار؟

• إذا كنت تعاني من حساسية تجاه الدوكسوروبيسين أو أي مشتق آخر من مشتقات هذا العقار.

• إذا كنت تعاني من الحساسية تجاه أي عقاقير مثل هذا العقار أو أي عقاقير أخرى، أو أطعمة أو أي مواد أخرى. أخبر طبيبك عن نوع الحساسية والعلامات التي ظهرت عليك مثل الطفح الجلدي أو الشرى أو الحكة أو ضيق النفس أو إحداث صوت صفير أثناء التنفس أو السعال أو تورم الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحلق أو أي علامات أخرى.

• إذا كنت تعاني من أي من المشكلات الصحية التالية: الأنيميا أو مرض القلب أو مرض الكبد أو انخفاض عدد الصفائح الدموية أو انخفاض عدد خلايا الدم البيضاء.

• إذا كنت قد تعرضت لنوبة قلبية حديثة.

• إذا سبق وتناولت daunorubicin (الداونوروبيسين) أو doxorubicin (الدوكسوروبيسين) أو epirubicin (الإبيوروبيسين) أو idarubicin (الإيداروبوسين) أو mitoxantrone (الميتوكسانترون)، فتحدث إلى طبيبك.

• إذا كنت تتناول أيًا من هذه العقاقير: فينوباريتال، أو فينتونين، أو أعشاب سانت جون، أو فيراباميل.

هذه ليست قائمة بكل العقاقير أو المشاكل الصحية التي تتفاعل مع هذا العقار.

أخبر طبيبك والصيدلي الذي تتعامل معه عن كل العقاقير التي تتناولها (التي صُرفت بوصفة طبية أو العقاقير المتاحة دون وصفة طبية أو المنتجات الطبيعية أو الفيتامينات) ومشاكلك الصحية. يجب أن تراجع جميع العقاقير للتحقق أنه يمكنك تناول هذا العقار بأمان إضافةً إلى جميع العقاقير التي تتعاطاها وفي وجود كل مشاكلك الصحية. تجنب البدء في تعاطي الجرعة من أي عقار أو إيقافها أو تغييرها دون الرجوع إلى طبيبك.

ما هي الاحتياطات التي ينبغي اتخاذها عند تناول هذا الدواء؟

- أخبر جميع مقدمي الرعاية الصحية لك بأنك تتناول هذا العقار. ومنهم الأطباء والممرضات والصيدال وأطباء الأسنان المعالجين لك.
- قد تزداد لديك فرصة الإصابة بالعدوى. اغسل يديك بكثرة. ابتعد عن المصابين بعدوى أو نزلات برد أو انفلونزا.
- قد تصاب بنزيف بسهولة أكثر. كن حريصاً، وتجنب الإصابة. ينبغي استعمال فرشاة أسنان ناعمة وماكيناة حلاقة كهربائية.
- استشر طبيبك إذا كنت تعاني من اضطراب في المعدة أو قيء أو سيولة في البراز (إسهال) أو عدم الشعور بالجوع. قد تكون هناك طرق لتقليل هذه الآثار الجانبية.
- للشفاء من قروح الفم، استخدم فرشاة أسنان ناعمة أو الماسحات القطنية ومضمض فمك. لا تستخدم مضمضة الفم التي يدخل الكحول في تركيبها.
- احرص على عدم ملامسة أفراد العائلة أو مقدمي الرعاية لسوائل الجسم. اغسل الملابس الملوثة على الفور واستخدم قفازات عند ملامسة سوائل الجسم لمدة لا تقل عن 5 أيام بعد كل مرة تتلقى فيها العلاج.
- تحدث إلى طبيبك قبل أن تأخذ أي لقاحات. استخدام هذا العقار قد يزيد من احتمال الإصابة بعدوى أو لا يُظهر مفعول اللقاح أيضاً.
- ستحتاج إلى الخضوع لفحص وظائف القلب أثناء تناولك لهذا العقار. استشر الطبيب.
- عليك إجراء فحوصات دموية حسب تعليمات الطبيب. يرجى استشارة الطبيب.
- إذا كنت تخطط للخضوع لعلاج بالإشعاع، استشر الطبيب. ظهرت أسوأ الأعراض الجانبية للعلاج بالإشعاع عند استخدام هذا العقار.
- لذلك يجب استعماله بحذر مع الأطفال. استشر الطبيب.
- قد يؤثر هذا العقار على الحيوانات المنوية لدى الرجال. وقد يؤثر ذلك على قدرة الرجل على الإنجاب. تحدث إلى الطبيب.
- إذا كنت رجلاً وتمارس الجماع ويمكن أن تحمل زوجتك، فاحرص على أن تجنبها الحمل خلال فترة الرعاية ولمدة 6 أشهر بعدها. وينبغي استعمال وسيلة منع حمل موثوق بها.
- قد يؤدي هذا العقار إلى توقف الدورة الشهرية لدى السيدات ممن يمكنهم الحمل. قد يؤثر ذلك على القدرة على الإنجاب. وليس معروفاً ما إذا كان سيعود هذا إلى الوضع الطبيعي. يُرجى استشارة الطبيب.
- قد يتسبب هذا العقار في إلحاق ضرر بالجنين إذا تناولته وأنت حامل. وإذا كنتِ حاملاً أو أصبحتِ حاملاً أثناء تناول هذا العقار، اتصلي بطبيبك على الفور.
- ينبغي استخدام وسيلة منع حمل موثوق بها أثناء تناول هذا العقار ولمدة 6 أشهر بعد إيقاف هذا العقار.
- إذا حملتِ أثناء تناول هذا العقار أو خلال 6 أشهر من إيقافه، اتصلي بالطبيب فوراً.
- يجب إخطار طبيبك، إذا كنتِ ترضعين رضاعة طبيعية. لا بد من التشاور بخصوص أي مخاطر قد يتعرض لها طفلك.

الأسباب الداعية للاتصال بأخصائي الرعاية الصحية على الفور.

- تحذير/تنبيه:** على الرغم من أن ذلك قد يكون نادراً، قد تظهر لدى بعض الأشخاص آثار جانبية سيئة للغاية وأحياناً آثار جانبية مميتة عند تناول أحد العقارات. أخبر طبيبك أو احصل على المساعدة الطبية على الفور إذا ظهرت لديك أي من العلامات أو الأعراض التالية والتي قد تكون مرتبطة بآثار جانبية سيئة للغاية:
- قد تحدث علامات على رد الفعل التحسسي، مثل الطفح الجلدي أو الشرى أو الحكة؛ أو احمرار البشرة أو تورمها أو انتشار البثور عليها أو تقشرها، ويصاحب ذلك حمى أو بدون حمى؛ أو إحداهن صغير أثناء التنفس أو ضيق في الصدر أو الحلق، أو صعوبة في التنفس أو الكلام؛ أو حدوث بحة غير عادية أو تورم في الفم أو الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحلق.
 - أعراض العدوى كالحمى، أو القشعريرة، أو التهاب شديد في الحلق، أو وجود ألم بالأذن أو الجيوب الأنفية، أو السعال، أو زيادة في البلغم أو تغير لونه، أو ألم عند التبول، أو وجود قروح بالفم، أو الإصابة بجرح لا يندمل.
 - أعراض نزيف مثل قيء دم أو قيء يشبه ثقل القهوة؛ أو خروج دم في السعال؛ أو ظهور دم في البول؛ أو براز أسود أو أحمر أو قطراني؛ أو نزيف من اللثة؛ أو نزيف مهبل غير طبيعي؛ أو ظهور كدمات بدون سبب أو زيادة حجمها؛ أو أي نزيف سيء للغاية أو لا يمكنك إيقافه.
 - التهاب الفم أو تقرحات بالفم.
 - إحساس غير معتاد بالحرقة أو بالتنميل أو الوخز.
 - نوبات مرضية.
 - ألم في الصدر.
 - تغيير في القدرة على الإبصار أو ألم بالعين أو تهيج شديد في العين.
 - قد يزداد احتمال تعرض مرضى السرطان الذين يتناولون هذا العقار للإصابة بمشكلة صحية شديدة وأحياناً تؤدي للوفاة تدعى متلازمة تحلل الورم (TLS). اتصل بطبيبك على الفور إذا تعرضت لازدياد سرعة ضربات القلب أو عدم انتظام ضربات القلب أو الإغماء أو انسداد في مجرى البول أو ضعف أو تقلص العضلات أو اضطراب المعدة أو القيء أو الإسهال أو عدم القدرة على الأكل أو الشعور بالحمول والكسل.

ما هي بعض الآثار الجانبية الأخرى لهذا العقار؟

جميع العقاقير قد تتسبب في آثار جانبية. ومع ذلك، فبعض الناس قد لا يصابون بأي من الآثار الجانبية أو قد يصابون ببعض الآثار الجانبية البسيطة. تحدث إلى طبيبك أو احصل على المساعدة الطبية إذا أزعجتك أو لم تختفي أي من هذه الآثار الجانبية أو أي آثار جانبية أخرى:

• اضطراب المعدة أو قيء.

• الإسهال أو البراز المتقلقل.

• تساقط الشعر.

• تغير في الأظافر.

• عدم الشعور بالجوع.

• زيادة في العطش.

• زيادة أو فقدان الوزن.

• ألم في البطن.

• قد يتغير لون البول أو أي من سوائل الجسم الأخرى للون البرتقالي أو الأحمر. هذا أمر طبيعي.

هذه ليست جميع الآثار الجانبية التي قد تقع. إذا راودتك أي أسئلة عن الأعراض الجانبية، اتصل بطبيبك. استشر طبيبك للحصول على المشورة الطبية بخصوص الآثار الجانبية. يمكنك الإبلاغ عن الآثار الجانبية إلى وكالة الصحة المحلية لديك.

ما هي أفضل طريقة لتناول الدواء؟

تناول هذا العقار حسبما أمر طبيبك. وقرأ جميع المعلومات المقدمة لك. واتبع كافة الإرشادات بعناية.

• يتم إعطاء هذا الدواء كحقن في الوريد على مدى فترة معينة من الوقت.

ماذا أفعل إذا فاتتني إحدى الجرعات؟

• اتصل بطبيبك لمعرفة ما يتعين عليك فعله.

كيف يتم تخزين هذا الدواء؟

• إذا كنت تريد تخزين هذا العقار في المنزل، فحدث إلى طبيبك أو الممرضة أو الصيدلي حول كيفية تخزينه.

إرشادات عامة

• إذا لم تتحسن الأعراض أو المشاكل الصحية التي تعاني منها أو إذا ازدادت سوءاً، اتصل بطبيبك.

• يحظر مشاركة العقاقير التي تتناولها مع أشخاص آخرين، ويحظر كذلك تناول أي عقاقير خاصة بشخص آخر.

• احتفظ بقائمة بالعقاقير (الوصفات الطبية والمستحضرات الطبيعية والفيتامينات والعقاقير المتاحة بدون وصفة طبية) الخاصة بك. قدم هذه القائمة لطبيبك.

• يرجى استشارة الطبيب قبل البدء في استخدام أي عقار جديد، وذلك يتضمن العقاقير المتاحة بوصفة أو بدون وصفة طبية أو المستحضرات الطبيعية أو الفيتامينات.

• احتفظ بجميع العقاقير في مكان آمن. احتفظ بجميع العقاقير بعيداً عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.

• استشر الصيدلي بخصوص كيفية التخلص من العقاقير غير المستخدمة.

• بعض العقاقير قد تحتوي على نشرة معلومات مريض مختلفة. إذا كانت لديك أية أسئلة عن هذا العقار، يرجى استشارة الطبيب أو الممرض أو الصيدلي الخاص بك أو غيرهم من مقدمي الرعاية الصحية.

• إذا اعتقدت أنك تناولت جرعة زائدة، اتصل بمركز مكافحة السموم لديك أو احصل على الرعاية الطبية على الفور. كن جاهزاً لعرض أو الإخبار عن ما تتناوله وكميته ومتى حدث ذلك.

استخدام معلومات المستهلك وإخلاء المسؤولية: لا ينبغي استخدام هذه المعلومات بغرض تحديد تناول هذا الدواء أو أي دواء آخر من عدمه. فمقدم الرعاية الصحية هو وحده من لديه من المعرفة والتدريب ما يتيح له تحديد أي الأدوية تناسب مريضاً بعينه. هذه المعلومات لا تجيز أي دواء باعتباره آمناً أو فعالاً أو معتمداً لعلاج أي مريض أو أي حالة صحية. هذا ليس إلا ملخصاً موجزاً لمعلومات عامة عن هذا الدواء فحسب. وهو لا يشمل مطلقاً كل المعلومات المتعلقة بالاستخدامات أو الإرشادات أو التحذيرات أو الاحتياطات أو التفاعلات أو الآثار الضارة أو المخاطر المحتملة التي قد تنطبق على هذا الدواء. هذه المعلومات ليست عبارة عن نصيحة طبية محددة ولا تحل محل المعلومات التي تحصل عليها من مقدم الرعاية الصحية الذي تتبناه. يجب أن تستشير مقدم الرعاية الصحية الذي تتبناه بخصوص المعلومات الكاملة عن مخاطر استخدام هذا الدواء وفوائده.

Last Updated 3/8/17

