

النطق

(ex e MES tane)

أسماء العلامات التجارية الأمريكية

Aromasin •

أسماء العلامات التجارية الكندية

Aromasin •
CO Exemestane •

ما هي أوجه استعمال هذا الدواء؟

يُستخدم هذا العقار لعلاج سرطان الثدي عند الإناث في سن اليأس.

وقد يتم وصفه لك لأسباب أخرى. يُرجى استشارة الطبيب.

ما الذي أحتاج أن أقوله لطبيبي قبل أن أتناول هذا العقار؟

إذا كنت تعاني من حساسية تجاه الإكسيمستان أو أي مشتق آخر من مشتقات هذا العقار.

إذا كنت تعاني من الحساسية تجاه أي عقاقير مثل هذا العقار أو أي عقاقير أخرى، أو أطعمة أو أي مواد أخرى. أخبر طبيبك عن نوع الحساسية والعلامات التي ظهرت عليك مثل الطفح الجلدي أو الشرى أو الحكة أو ضيق النفس أو إحداث صوت صغير أثناء التنفس أو السعال أو تورم الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحلق أو أي علامات أخرى.

إذا لم تبلغني بعد مرحلة انقطاع الطمث الطبيعية و لا تزال لديك القدرة على الإنجاب.

إذا كنت تتناول منتجات الاستروجين.

إذا كنتِ ترضعين رضاعة طبيعية. لا ترضعين طفلك أثناء تناول هذا العقار ولمدة 1 شهر بعد التوقف عن تناول هذا العقار.

هذه ليست قائمة بكل العقاقير أو المشاكل الصحية التي تتفاعل مع هذا العقار.

أخبر طبيبك والصيدلي الذي تتعامل معه عن كل العقاقير التي تتناولها (التي صُرِّفت بوصفة طبية أو العقاقير المتاحة دون وصفة طبية أو المنتجات الطبيعية أو الفيتامينات) ومشاكلك الصحية. يجب أن تراجع جميع العقاقير لتحقق أنه يمكنك تناول هذا العقار بأمان إضافةً إلى جميع العقاقير التي تتعاطاها وفي وجود كل مشاكلك الصحية. تجنب البدء في تعاطي الجرعة من أي عقار أو إيقافها أو تغييرها دون الرجوع إلى طبيبك.

ما هي الاحتياطات التي ينبغي اتخاذها عند تناول هذا الدواء؟

أخبر جميع مقدمي الرعاية الصحية لك بأنك تتناول هذا العقار. ومنهم الأطباء والمرضات والصيدال وأطباء الأسنان المعالجين لك.

عليك إجراء فحوصات دموية حسب تعليمات الطبيب. يرجى استشارة الطبيب.

حدثت حالات ارتفاع في ضغط الدم عند استخدام هذا العقار. قم بعمل فحوصات لضغط الدم حسب تعليمات الطبيب.

قد يسبب هذا العقار ضعفاً في العظام (هشاشة العظام) مع الاستخدام على المدى الطويل. تحدث إلى طبيبك لمعرفة ما إذا كانت فرصتك أكبر للإصابة بهشاشة العظام أو إذا كانت لديك أية أسئلة.

أحرص على عمل فحص كثافة العظام وفق تعليمات طبيبك. استشر الطبيب.

تناول الكالسيوم وفيتامين د وفقاً لتوجيهات طبيبك.

قد يؤثر هذا العقار على الخصوبة. قد تتسبب مشكلات الخصوبة في عدم قدرتك على الحمل أو قدرتك على الإنجاب. استشر الطبيب.

قد يتسبب هذا العقار في إلحاق ضرر بالجنين إذا تناولته وأنت حامل.

إذا كنتِ قادرة على الحمل، سيتم إجراء اختبار حمل للتأكد من أنك لست حاملاً قبل بدء تناول هذا العقار. يرجى استشارة طبيبك.

ينبغي استخدام وسيلة منع حمل موثوق بها أثناء تناول هذا العقار ولمدة شهر بعد إيقاف هذا العقار.

في حالة حدوث حمل أثناء تناول هذا العقار أو خلال شهر واحد بعد التوقف عن تناول العقار، فاتصلي بالطبيب فوراً.

الأسباب الداعية للاتصال بأخصائي الرعاية الصحية على الفور.

تحذير/تنبيه: على الرغم من أن ذلك قد يكون نادرًا، قد تظهر لدى بعض الأشخاص آثار جانبية سيئة للغاية وأحيانًا آثار جانبية مميتة عند تناول أحد العقارات. اخبر طبيبك أو احصل على المساعدة الطبية على الفور إذا ظهرت لديك أي من العلامات أو الأعراض التالية والتي قد تكون مرتبطة بآثار جانبية سيئة للغاية:

• قد تحدث علامات على رد الفعل التحسسي، مثل الطفح الجلدي أو الشرى أو الحكة؛ أو احمرار البشرة أو تورمها أو انتشار البثور عليها أو تقشرها، ويصاحب ذلك حمى أو بدون حمى؛ أو إحداث صغير أثناء التنفس أو ضيق في الصدر أو الحلق، أو صعوبة في التنفس أو الكلام؛ أو حدوث بحة غير عادية أو تورم في الفم أو الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحلق.

• أعراض ارتفاع ضغط الدم مثل الشعور بصداع حاد أو دوام أو إغماء أو تغيير في الإبصار.

• آلام أو ضغوط الصدر.

• الضعف في جانب واحد من الجسم، أو صعوبة في الكلام أو التفكير، أو تغير في الاتزان، أو تهدل أحد جانبي الوجه، أو عدم وضوح الرؤية.

• ضيق التنفس أو زيادة كبيرة في الوزن أو تورم في الذراعين أو الساقين.

• الشعور بتورم أو سخونة أو تنميل أو تغيير في اللون أو ألم في الساق أو الذراع.

• ألم العظام.

• تغير في الرؤية.

• انخفاض الحالة المزاجية (الاكتئاب).

ما هي بعض الآثار الجانبية الأخرى لهذا العقار؟

جميع العقاقير قد تتسبب في آثار جانبية. ومع ذلك، فبعض الناس قد لا يصابون بأي من الآثار الجانبية أو قد يصابون ببعض الآثار الجانبية البسيطة. تحدث إلى طبيبك أو احصل على المساعدة الطبية إذا أزعجتك أو لم تختفي أي من هذه الآثار الجانبية أو أي آثار جانبية أخرى:

• الصداع.

• الهبات الساخنة.

• اضطراب المعدة أو قيء.

• ألم في البطن.

• الإسهال أو البراز المتقلقل.

• الإمساك.

• زيادة الشهية.

• آلام في العضلات أو المفاصل.

• تساقط الشعر.

• الشعور بالإرهاق أو الضعف.

• انعدام القدرة على النوم.

• عرق شديد.

• ألم في الظهر.

• الدوار.

• القلق.

هذه ليست جميع الآثار الجانبية التي قد تقع. إذا راودتك أي أسئلة عن الأعراض الجانبية، اتصل بطبيبك. استشر طبيبك للحصول على المشورة الطبية بخصوص الآثار الجانبية.

يمكنك الإبلاغ عن الآثار الجانبية إلى وكالة الصحة المحلية لديك.

ما هي أفضل طريقة لتناول الدواء؟

تناول هذا العقار حسبما أمر طبيبك. واقرأ جميع المعلومات المقدمة لك. واتبع كافة الإرشادات بعناية.

• تناول هذا العقار بعد الوجبة.

• تناول هذا العقار في نفس الوقت من اليوم.

• للحصول على أقصى استفادة، لا تغفل عن تناول أي جرعات.

• احرص على تناول هذا العقار حسب تعليمات طبيبك أو مقدم آخر للرعاية الصحية، حتى لو شعرت بتحسن.

ماذا أفعل إذا فاتتني إحدى الجرعات؟

• تناول الجرعة الفائتة فور تذكرك.

• إذا اقترب موعد الجرعة التالية، فتخط الجرعة الفائتة وارجع لمواعيدك العادية.

• يحظر تناول جرعتين في نفس الوقت أو جرعات إضافية.

كيف يتم تخزين هذا الدواء؟

• يُخزن في درجة حرارة الغرفة.

• احفظ العقار في مكان جاف. يحظر التخزين في الحمام.

• احتفظ بجميع العقاقير في مكان آمن. احتفظ بجميع العقاقير بعيداً عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.

• استشر الصيدلي بخصوص كيفية التخلص من العقاقير غير المستخدمة.

إرشادات عامة

• إذا لم تتحسن الأعراض أو المشاكل الصحية التي تعاني منها أو إذا ازدادت سوءاً، اتصل بطبيبك.

• يحظر مشاركة العقاقير التي تتناولها مع أشخاص آخرين، ويحظر كذلك تناول أي عقاقير خاصة بشخص آخر.

• احتفظ بقائمة بالعقاقير (الوصفات الطبية والمستحضرات الطبيعية والفيتامينات والعقاقير المتاحة بدون وصفة طبية) الخاصة بك. قدم هذه القائمة لطبيبك.

• يرجى استشارة الطبيب قبل البدء في استخدام أي عقار جديد، وذلك يتضمن العقاقير المتاحة بوصفة أو بدون وصفة طبية أو المستحضرات الطبيعية أو الفيتامينات.

• بعض العقاقير قد تحتوي على نشرة معلومات مريض مختلفة. إذا كانت لديك أية أسئلة عن هذا العقار، يرجى استشارة الطبيب أو الممرض أو الصيدلي الخاص بك أو غيرهم من مقدمي الرعاية الصحية.

• إذا اعتقدت أنك تناولت جرعة زائدة، اتصل بمركز مكافحة السموم لديك أو احصل على الرعاية الطبية على الفور. كن جاهزاً لعرض أو الإخبار عن ما تتناوله وكميته ومتى حدث ذلك.

استخدام معلومات المستهلك وإخلاء المسؤولية: لا ينبغي استخدام هذه المعلومات بغرض تحديد تناول هذا الدواء أو أي دواء آخر من عدمه. فمقدم الرعاية الصحية هو وحده من لديه من المعرفة والتدريب ما يتيح له تحديد أي الأدوية تناسب مريضاً بعينه. هذه المعلومات لا تجيز أي دواء باعتباره آمناً أو فعالاً أو معتمداً لعلاج أي مريض أو أي حالة صحية. هذا ليس إلا ملخصاً موجزاً لمعلومات عامة عن هذا الدواء فحسب. وهو لا يشمل مطلقاً كل المعلومات المتعلقة بالاستخدامات أو الإرشادات أو التحذيرات أو الاحتياطات أو التفاعلات أو الآثار الضارة أو المخاطر المحتملة التي قد تنطبق على هذا الدواء. هذه المعلومات ليست عبارة عن نصيحة طبية محددة ولا تحل محل المعلومات التي تحصل عليها من مقدم الرعاية الصحية الذي تتبعه. يجب أن تستشير مقدم الرعاية الصحية الذي تتبعه بخصوص المعلومات الكاملة عن مخاطر استخدام هذا الدواء وفوائده.

Last Updated 4/4/17

