

النطق

(GOE se rel in)

أسماء العلامات التجارية الأمريكية

Zoladex •

أسماء العلامات التجارية الكندية

Zoladex •

Zoladex LA •

ما هي أوجه استعمال هذا الدواء؟

• يُستخدم هذا العقار لعلاج سرطان البروستاتا.

• يُستخدم هذا العقار لعلاج الانتباذ البطاني الرحمي.

• يُستخدم هذا العقار لعلاج سرطان الثدي.

• يُستخدم هذا العقار لعلاج نزيف الرحم.

• وقد يتم وصفه لك لأسباب أخرى. يُرجى استشارة الطبيب.

ما الذي أحتاج أن أقوله لطبيبي قبل أن أتناول هذا العقار؟

جميع الأشكال:

• إذا كنت تعاني من حساسية تجاه الجوسيريلين أو أي مشتق آخر من مشتقات هذا العقار.

• إذا كنت تعاني من الحساسية تجاه أي عقاقير مثل هذا العقار أو أي عقاقير أخرى، أو أطعمة أو أي مواد أخرى. أخبر طبيبك عن نوع الحساسية والعلامات التي ظهرت عليك مثل الطفح الجلدي أو الشرى أو الحكة أو ضيق النفس أو إحداث صوت صفير أثناء التنفس أو السعال أو تورم الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحلق أو أي علامات أخرى.

10,8 ملجم:

• إذا كنت أنثى. هذا العقار غير معتمد لاستخدامه مع السيدات. إذا كنت امرأة تستخدم هذا العقار، فاستشيري طبيبك إذا كنتِ حاملاً أو تخططين للحمل أو ترضعين رضاعة طبيعية.

3,6 ملجم:

• إذا كنت تعاني من نزيف مهبلي مجهول السبب.

• إذا كنتِ حاملاً.

• إذا كنت ترضعين رضاعة طبيعية أو تخططين للإرضاع رضاعة طبيعية.

هذه ليست قائمة بكل العقاقير أو المشاكل الصحية التي تتفاعل مع هذا العقار.

أخبر طبيبك والصيدلي الذي تتعامل معه عن كل العقاقير التي تتناولها (التي صُرّفت بوصفة طبية أو العقاقير المتاحة دون وصفة طبية أو المنتجات الطبيعية أو الفيتامينات) ومشاكلك الصحية. يجب أن تراجع جميع العقاقير لتتحقق أنه يمكنك تناول هذا العقار بأمان إضافةً إلى جميع العقاقير التي تتعاطاها وفي وجود كل مشاكلك الصحية. تجنب البدء في تعاطي الجرعة من أي عقار أو إيقافها أو تغييرها دون الرجوع إلى طبيبك.

ما هي الاحتياطات التي ينبغي اتخاذها عند تناول هذا الدواء؟

جميع الأشكال:

• أخبر جميع مقدمي الرعاية الصحية لك بأنك تتناول هذا العقار. ومنهم الأطباء والممرضات والصيدالدة وأطباء الأسنان المعالجين لك.

• قد يرفع هذا العقار من مستويات بعض الهرمونات في جسدك أثناء الأسابيع القليلة الأولى من تناوله. قد تسوء أعراض المرض قبل التحسن. استشر طبيبك إذا تعرضت لأي أعراض جديدة أو ساعات أعراض مرضك لأكثر من بضعة أسابيع بعد بدء هذا العقار.

• يعمل هذا العقار على خفض مستويات بعض الهرمونات في الجسم. قد يسبب هذا بعض الآثار مثل تغير حجم الثدي أو ألم أو وجع في الثدي أو تغيرات في الخصية لدى الرجال أو تغير في قدرة الرجال على الجماع أو هبات ساخنة أو تعرق. يرجى استشارة الطبيب.

• عليك إجراء فحوصات دموية حسب تعليمات الطبيب. يرجى استشارة الطبيب.

• قد يؤثر هذا العقار على بعض التحاليل المخبرية. أخبر جميع مقدمي الرعاية الصحية لك والعاملين في المختبر بأنك تتناول هذا العقار.

• قد يزيد هذا العقار من احتمالية التعرض لارتفاع مستوى السكر في الدم (مرض السكر). استشر الطبيب.

• في حالة الإصابة بارتفاع نسبة السكر في الدم (مرض السكر)، استشر طبيبك.

• يجب فحص نسبة السكر في الدم حسب توجيهات طبيبك.

• قد يتسبب هذا العقار في ضعف العظام. قد يحدث ذلك بشكل متكرر إذا تم تناوله لفترة طويلة. وقد ينجم عن ذلك زيادة احتمال التعرض لكسر بالعظام. اتصل بطبيبك فورًا إذا شعرت بالألم في العظام.

• احرص على عمل فحص كثافة العظام وفق تعليمات طبيبك. استشر الطبيب.

• حدثت إصابات في موضع حقن هذا الدواء، كما حدثت إصابة للأوعية الدموية عند استخدام هذا الدواء. وتشمل هذه الإصابات على الألم والكدمات والنزيف. وفي بعض الأحيان، أدت تلك الإصابات إلى الحاجة إلى نقل الدم أو الخضوع للجراحة. استشر الطبيب.

• تم ملاحظة احتمالية كبيرة للإصابة بسكتة دماغية أو مشاكل بالغة الخطورة ومميتة أحيانًا في القلب مع استعمال عقاقير شبيهه بهذا العقار لدى الرجال. توجد احتمالية ضئيلة، لكن إذا كنت تعاني من ألم أو ضغط في الصدر أو تغير في القوة بأحد الجانبين حيث يكون أحدهما أقوى من الآخر أو صعوبة في الكلام أو التفكير أو تغيير في التوازن أو تغير في الرؤية، فالتمس المساعدة الطبية فورًا.

3.6 ملجم:

• في معظم الأحيان، يتسبب هذا العقار في إيقاف الدورة الشهرية لديك. لا يعد هذا العقار وسيلة لمنع الحمل. استخدم إحدى وسائل منع الحمل التي لا تعتمد على الهرمونات مثل الواقيات الذكرية لمنع الحمل أثناء تناول هذا العقار.

• إذا فاتتك جرعات من هذا العقار، فقد يحدث نزيف ما بين الدورات الشهرية. هناك أيضًا احتمال حدوث حمل إذا فاتتك جرعات من هذا العقار. استشر طبيبك.

• قد يتسبب هذا العقار في إلحاق ضرر بالجنين إذا تناولته وأنت حامل.

• ينبغي استخدام وسيلة موثوق بها لمنع الحمل أثناء تناول هذا العقار ولمدة 3 أشهر بعد انتهاء العلاج.

• في حالة حدوث حمل أثناء تناول هذا العقار أو خلال 3 أشهر بعد تناول آخر جرعة، اتصل بطبيبك على الفور.

الأسباب الداعية للاتصال بأخصائي الرعاية الصحية على الفور.

تحذير/تنبيه: على الرغم من أن ذلك قد يكون نادرًا، قد تظهر لدى بعض الأشخاص آثار جانبية سيئة للغاية وأحيانًا آثار جانبية مميتة عند تناول أحد العقارات. أخبر طبيبك أو احصل على المساعدة الطبية على الفور إذا ظهرت لديك أي من العلامات أو الأعراض التالية والتي قد تكون مرتبطة بآثار جانبية سيئة للغاية:

جميع الأشكال:

• قد تحدث علامات على رد الفعل التحسسي، مثل الطفح الجلدي أو الشرى أو الحكة؛ أو احمرار البشرة أو تورمها أو انتشار البثور عليها أو تقشرها، وبصاحب ذلك حمى أو بدون حمى؛ أو إحداث صفير أثناء التنفس أو ضيق في الصدر أو الحلق، أو صعوبة في التنفس أو الكلام؛ أو حدوث بحة غير عادية أو تورم في الفم أو الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحلق.

• علامات تدل على ارتفاع نسبة السكر في الدم مثل التشوش أو الشعور بالنعاس أو ازدياد الشعور بالعطش أو الجوع أو كثرة عدد مرات التبول أو احمرار الوجه أو سرعة التنفس أو رائحة نفس تشبه رائحة الفواكه.

• علامات على ارتفاع مستوى الكالسيوم مثل الضعف، أو الاضطراب، أو الإحساس بالإرهاق، أو الصداع، أو اضطراب المعدة والقيء، أو البراز الصلب (الإمساك)، أو الإحساس بالألم في العظام.

• دلالات أو أعراض الاكتئاب أو الأفكار الانتحارية أو العصبية أو التقلبات العاطفية أو التفكير غير السوي أو القلق أو انعدام الرغبة في الحياة.

• ضيق التنفس أو زيادة كبيرة في الوزن أو تورم في الذراعين أو الساقين.

• العجز عن التبول.

• ألم عند التبول.

• تهيج في موضع الحقن.

• ألم في الظهر.

• ألم في البطن.

• انتفاخ البطن.

• الدوار.

• دم في البول.

• البول الداكن.

• التقيؤ دمًا أو قيء يشبه ثفل القهوة.

• إحساس غير معتاد بالحرقة أو بالتنميل أو الوخز.

• الحمى وقشعريرة البرد.

• التهاب الحلق.

• نادراً ما حدثت مشكلة خطيرة جداً في الغدة النخامية (السكتة النخامية) مع تناول هذا العقار. في أغلب الأوقات، حدث هذا خلال أسبوعين بعد الجرعة الأولى. اتصل بطبيبك فوراً إذا شعرت بصداق مفاجئ أو تعرضت للقيء أو الإغماء أو التغيرات المزاجية أو ضعف في العينين أو عدم القدرة على تحريك العينين أو حدوث تغير في الإبصار.

• قد يحدث نوع من عدم انتظام ضربات القلب (فترة QT مطولة) مع هذا العقار. اتصل بطبيبك فوراً إذا شعرت بسرعة في ضربات القلب، أو بأن ضربات قلبك غير منتظمة، أو إذا فقدت الوعي.

3,6 ملجم:

• نزيف مهلي غير طبيعي.

ما هي بعض الآثار الجانبية الأخرى لهذا العقار؟

جميع العقاقير قد تتسبب في آثار جانبية. ومع ذلك، فبعض الناس قد لا يصابون بأي من الآثار الجانبية أو قد يصابون ببعض الآثار الجانبية البسيطة. تحدث إلى طبيبك أو احصل على المساعدة الطبية إذا أزعجتك أو لم تختفي أي من هذه الآثار الجانبية أو أي آثار جانبية أخرى:

جميع الأشكال:

• البثور (حب الشباب).

• الصداع.

• انخفاض في الرغبة الجنسية.

• الإسهال أو البراز المتقلقل.

• عدم الشعور بالجوع.

• الغثيان.

• الشعور بالإرهاق أو الضعف.

• انعدام القدرة على النوم.

3,6 ملجم:

• تهيج المهبل.

هذه ليست جميع الآثار الجانبية التي قد تقع. إذا راودتك أي أسئلة عن الأعراض الجانبية، اتصل بطبيبك. استشر طبيبك للحصول على المشورة الطبية بخصوص الآثار الجانبية. يمكنك الإبلاغ عن الآثار الجانبية إلى وكالة الصحة المحلية لديك.

ما هي أفضل طريقة لتناول الدواء؟

تناول هذا العقار حسبما أمر طبيبك. وقرأ جميع المعلومات المقدمة لك. واتبع كافة الإرشادات بعناية.

• يعطى العقار كحقنة في إحدى مناطق الجلد الملينة بالدهون.

ماذا أفعل إذا فاتتني إحدى الجرعات؟

• اتصل بطبيبك لمعرفة ما يتعين عليك فعله.

كيف يتم تخزين هذا الدواء؟

• إذا كنت تريد تخزين هذا العقار في المنزل، فتحدث إلى طبيبك أو الممرضة أو الصيدلي حول كيفية تخزينه.

إرشادات عامة

• إذا لم تتحسن الأعراض أو المشاكل الصحية التي تعاني منها أو إذا ازدادت سوءاً، اتصل بطبيبك.

• يحظر مشاركة العقاقير التي تتناولها مع أشخاص آخرين، ويحظر كذلك تناول أي عقاقير خاصة بشخص آخر.

• احتفظ بقائمة بالعقاقير (الوصفات الطبية والمستحضرات الطبيعية والفيتامينات والعقاقير المتاحة بدون وصفة وطبية) الخاصة بك. قدم هذه القائمة لطبيبك.

• يرجى استشارة الطبيب قبل البدء في استخدام أي عقار جديد، وذلك يتضمن العقاقير المتاحة بوصفة أو بدون وصفة طبية أو المستحضرات الطبيعية أو الفيتامينات.

• احتفظ بجميع العقاقير في مكان آمن. احتفظ بجميع العقاقير بعيداً عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.

• استشر الصيدلي بخصوص كيفية التخلص من العقاقير غير المستخدمة.

• بعض العقاقير قد تحتوي على نشرة معلومات مريض مختلفة. إذا كانت لديك أية أسئلة عن هذا العقار، يرجى استشارة الطبيب أو الممرض أو الصيدلي الخاص بك أو غيرهم من مقدمي الرعاية الصحية.

• إذا اعتقدت أنك تناولت جرعة زائدة، اتصل بمركز مكافحة السموم لديك أو احصل على الرعاية الطبية على الفور. كن جاهزاً لعرض أو الإخبار عن ما تتناوله وكميته ومتى حدث ذلك.

استخدام معلومات المستهلك وإخلاء المسؤولية: لا ينبغي استخدام هذه المعلومات بغرض تحديد تناول هذا الدواء أو أي دواء آخر من عدمه. فمقدم الرعاية الصحية هو وحده من لديه من المعرفة والتدريب ما يتيح له تحديد أي الأدوية تناسب مريضاً بعينه. هذه المعلومات لا تجيز أي دواء باعتباره آمناً أو فعالاً أو معتمداً لعلاج أي مريض أو أي حالة صحية. هذا ليس إلا ملخصاً موجزاً للمعلومات عامة عن هذا الدواء فحسب. وهو لا يشمل مطلقاً كل المعلومات المتعلقة بالاستخدامات أو الإرشادات أو التحذيرات أو الاحتياطات أو التفاعلات أو الآثار الضارة أو المخاطر المحتملة التي قد تنطبق على هذا الدواء. هذه المعلومات ليست عبارة عن نصيحة طبية محددة ولا تحل محل المعلومات التي تحصل عليها من مقدم الرعاية الصحية الذي تتبعه. يجب أن تستشير مقدم الرعاية الصحية الذي تتبعه بخصوص المعلومات الكاملة عن مخاطر استخدام هذا الدواء وقوائمه.

Last Updated 4/4/17



حقوق التأليف والنشر © 2017 مملوكة لشركة Wolters Kluwer Clinical Drug Information, Inc. والشركات التابعة لها ولأو مانحي التراخيص. جميع الحقوق محفوظة.