

النطق

(ip i LIM u mab)

أسماء العلامات التجارية الأمريكية

• Yervoy

أسماء العلامات التجارية الكندية

• Yervoy

تحذير

• قد يتسبب هذا العقار في ظهور آثار جانبية خطيرة وأحياناً مميتة. وقد تحدث هذه الآثار في أي جزء من الجسم. في معظم الأحوال، تحدث هذه الآثار في الأمعاء والكبد والجلد والأعصاب. وقد تؤثر كذلك على الأعضاء المسؤولة عن تغيير مستويات الهرمونات في الجسم. يمكن أن تؤدي الآثار الجانبية التي تحدث في الأعصاب إلى عدم القدرة على تحريك جزء من الجسم (شلل). وفي معظم الأحوال، تظهر هذه الآثار الجانبية أثناء استخدام هذا العقار ولكن أحياناً تظهر بعد أسابيع إلى أشهر من التوقف عن تناول هذا العقار. تحدث إلى طبيبك في هذا الأمر.

• عليك إجراء فحوصات دموية حسب تعليمات الطبيب. يرجى استشارة الطبيب.

• وأخبر طبيبك على الفور إذا ظهرت عليك أي من العلامات أو الأعراض التالية والتي قد تكون مرتبطة بآثار جانبية سيئة للغاية:

• علامات وجود مشاكل الكبد مثل بول داكن اللون أو الشعور بالإرهاق أو عدم الشعور بالجوع أو اضطراب في المعدة أو ألم في المعدة أو براز فاتح اللون أو قيء أو اصفرار لون الجلد أو العيون.

• أعراض مشكلات الأمعاء مثل البراز الأسود أو القطراني أو المدمم؛ أو الحمى؛ أو ظهور مخاط في البراز؛ أو التقيؤ مصحوباً بدم أو يشبه ثفل القهوة؛ أو ألم حاد في المعدة؛ أو براز شديدة الصلابة (إمساك) أو سيولة في البراز (إسهال).

• أعراض مشكلات الهرمونات مثل التغيير في طريقة تصرفاتك أو الدوار أو الإغماء أو الشعور بالبرد دائماً أو الشعور بالخمول والكسل أو قلة الرغبة في الجماع أو مشكلات في الذاكرة أو التغيير في الحالة المزاجية أو صداع حاد جداً أو زيادة الوزن.

• أعراض رد فعل جلدي حاد (متلازمة ستيف جونسون/انحلال البشرة النخري السمي) مثل احمرار الجلد أو تورمه أو انتشار البثور عليه أو تقشره (بحمي أو بدون حمى)؛ أو احمرار العين أو تهيجها؛ أو قروح في الفم أو الحلق أو الأنف أو العينين.

• قد تظهر أعراض لمشكلات بالأعصاب مثل الشعور بحرق أو بخدر أو وخز غير عادي، أو الشعور بالوهن، أو عدم القدرة على تحريك جزء من الجسم (شلل).

ما هي أوجه استعمال هذا الدواء؟

• فهو يستخدم لعلاج نوع من سرطان الجلد (الورم الميلانيني).

ما الذي أحتاج أن أقوله لطبيبي قبل أن أتناول هذا العقار؟

• إذا كانت لديك حساسية تجاه الإبيماماب أو أي مشتق آخر من مشتقات هذا الدواء.

• إذا كنت تعاني من الحساسية تجاه أي عقاقير مثل هذا العقار أو أي عقاقير أخرى، أو أطعمة أو أي مواد أخرى. أخبر طبيبك عن نوع الحساسية والعلامات التي ظهرت عليك مثل الطفح الجلدي أو الشرى أو الحكة أو ضيق النفس أو إحداث صوت صغير أثناء التنفس أو السعال أو تورم الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحلق أو أي علامات أخرى.

• إذا كنت تُرضعين رضاعة طبيعية. أوقفي الرضاعة الطبيعية أثناء تناول هذا العقار أو لمدة 3 أشهر بعد الجرعة الأخيرة.

قد يتفاعل هذا العقار مع العقاقير الأخرى أو المشاكل الصحية الأخرى.

أخبر طبيبك والصيدلي الذي تتعامل معه عن كل العقاقير التي تتناولها (التي صُرِفَتْ بوصفة طبية أو العقاقير المتاحة دون وصفة طبية أو المنتجات الطبيعية أو الفيتامينات) ومشاكلك الصحية. يجب أن تراجع جميع العقاقير لتتحقق أنه يمكنك تناول هذا العقار بأمان إضافةً إلى جميع العقاقير التي تتعاطاها وفي وجود كل مشاكلك الصحية. تجنب البدء في تعاطي الجرعة من أي عقار أو إيقافها أو تغييرها دون الرجوع إلى طبيبك.

ما هي الاحتياطات التي ينبغي اتخاذها عند تناول هذا الدواء؟

• أخبر جميع مقدمي الرعاية الصحية لك بأنك تتناول هذا العقار. ومنهم الأطباء والمرضات والصيادلة وأطباء الأسنان المعالجين لك.

• يمكن استعمال هذا العقار مع عقار آخر يُسمى نيفلوماب. بعض الأعراض الجانبية المحتملة قد تحدث بشكل متكرر في حالة استخدام هذا العقار مع نيفلوماب، إذا كنت تتناول نيفلوماب أيضًا، فاستشر طبيبك حول المخاطر والأعراض الجانبية التي قد تحدث.

• تحدث إلى طبيبك قبل أن تأخذ أي لقاحات. استخدام هذا العقار قد يزيد من احتمال الإصابة بعدوى أو لا يُظهر مفعول اللقاح أيضًا.

• قد يتسبب هذا العقار في إلحاق ضرر بالجنين إذا تناولته وأنتِ حامل.

• ينبغي استخدام وسيلة موثوق بها لمنع الحمل أثناء تناول هذا العقار ولمدة 3 أشهر بعد انتهاء العلاج.

• في حالة حدوث حمل أثناء تناول هذا العقار أو خلال 3 أشهر بعد تناول آخر جرعة، اتصل بطبيبك على الفور.

الأسباب الداعية للاتصال بأخصائي الرعاية الصحية على الفور.

تحذير/تنبيه: على الرغم من أن ذلك قد يكون نادرًا، قد تظهر لدى بعض الأشخاص آثار جانبية سيئة للغاية وأحيانًا آثار جانبية مميتة عند تناول أحد العقارات. أخبر طبيبك أو احصل على المساعدة الطبية على الفور إذا ظهرت لديك أي من العلامات أو الأعراض التالية والتي قد تكون مرتبطة بآثار جانبية سيئة للغاية:

• قد تحدث علامات على رد الفعل التحسسي، مثل الطفح الجلدي أو الشرى أو الحكة؛ أو احمرار البشرة أو تورمها أو انتشار البثور عليها أو تقشرها، وبصاحب ذلك حمى أو بدون حمى؛ أو إحداث صغير أثناء التنفس أو ضيق في الصدر أو الحلق، أو صعوبة في التنفس أو الكلام؛ أو حدوث بحة غير عادية أو تورم في الفم أو الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحلق.

• أعراض مشاكل الكلى مثل عدم القدرة على التبول أو تغير في كمية البول أو وجود دم في البول أو زيادة كبيرة في الوزن.

• علامات وجود مشكلة في البنكرياس (التهاب البنكرياس) مثل ألم شديد جدًا في المعدة أو ألم شديد جدًا في الظهر أو اضطراب شديد جدًا في المعدة أو قيء.

• ضيق التنفس أو زيادة كبيرة في الوزن أو تورم في الذراعين أو الساقين.

• آلام أو ضغوط الصدر.

• تغيير في القدرة على الإبصار أو ألم بالعين أو تهيج شديد في العين.

• أي كدمات أو نزيف مجهول السبب.

• تغير في الحركات الاعتيادية للأمعاء.

ما هي بعض الآثار الجانبية الأخرى لهذا العقار؟

جميع العقاقير قد تتسبب في آثار جانبية. ومع ذلك، فبعض الناس قد لا يصابون بأي من الآثار الجانبية أو قد يصابون ببعض الآثار الجانبية البسيطة. تحدث إلى طبيبك أو احصل على المساعدة الطبية إذا أزعجتك أو لم تختفي أي من هذه الآثار الجانبية أو أي آثار جانبية أخرى:

• الشعور بالإرهاق أو الضعف.

• الإسهال أو البراز المتقلقل.

• الصداع.

• اضطراب المعدة أو قيء.

• عدم الشعور بالجوع.

• انعدام القدرة على النوم.

• فقد الوزن.

هذه ليست جميع الآثار الجانبية التي قد تقع. إذا راودتك أي أسئلة عن الأعراض الجانبية، اتصل بطبيبك. استشر طبيبك للحصول على المشورة الطبية بخصوص الآثار الجانبية.

يمكنك الإبلاغ عن الآثار الجانبية إلى وكالة الصحة المحلية لديك.

ما هي أفضل طريقة لتناول الدواء؟

تناول هذا العقار حسبما أمر طبيبك. واقرأ جميع المعلومات المقدمة لك. واتبع كافة الإرشادات بعناية.

يتم إعطاء هذا الدواء كحقن في الوريد على مدى فترة معينة من الوقت.

ماذا أفعل إذا فاتتني إحدى الجرعات؟

• اتصل بطبيبك لمعرفة ما يتعين عليك فعله.

كيف يتم تخزين هذا الدواء؟

• إذا كنت تريد تخزين هذا العقار في المنزل، فتحدث إلى طبيبك أو الممرضة أو الصيدلي حول كيفية تخزينه.

إرشادات عامة

• إذا لم تتحسن الأعراض أو المشاكل الصحية التي تعاني منها أو إذا ازدادت سوءًا، اتصل بطبيبك.

- يحظر مشاركة العقاقير التي تتناولها مع أشخاص آخرين، ويحظر كذلك تناول أي عقاقير خاصة بشخص آخر.
- احتفظ بقائمة بالعقاقير (الوصفات الطبية والمستحضرات الطبيعية والفيتامينات والعقاقير المتاحة بدون وصفة وطبية) الخاصة بك. قدم هذه القائمة لطبيبك.
- يرجى استشارة الطبيب قبل البدء في استخدام أي عقار جديد، وذلك يتضمن العقاقير المتاحة بوصفة أو بدون وصفة طبية أو المستحضرات الطبيعية أو الفيتامينات.
- احتفظ بجميع العقاقير في مكان آمن. احتفظ بجميع العقاقير بعيدًا عن تناول الأطفال والحيوانات الأليفة.
- استشر الصيدلي بخصوص كيفية التخلص من العقاقير غير المستخدمة.
- بعض العقاقير قد تحتوي على نشرة معلومات مريض مختلفة. إذا كانت لديك أية أسئلة عن هذا العقار، يرجى استشارة الطبيب أو الممرض أو الصيدلي الخاص بك أو غيرهم من مقدمي الرعاية الصحية.
- إذا اعتقدت أنك تناولت جرعة زائدة، اتصل بمركز مكافحة السموم لديك أو احصل على الرعاية الطبية على الفور. كن جاهزًا لعرض أو الإبلاغ عن ما تتناوله وكميته ومتى حدث ذلك.

استخدام معلومات المستهلك وإخلاء المسؤولية: لا ينبغي استخدام هذه المعلومات بغرض تحديد تناول هذا الدواء أو أي دواء آخر من عدمه. فمقدم الرعاية الصحية هو وحده من لديه من المعرفة والتدريب ما يتيح له تحديد أي الأدوية تناسب مريضًا بعينه. هذه المعلومات لا تجيز أي دواء باعتباره آمنًا أو فعالًا أو معتمدًا لعلاج أي مريض أو أي حالة صحية. هذا ليس إلا ملخصًا موجزًا لمعلومات عامة عن هذا الدواء فحسب. وهو لا يشمل مطلقًا كل المعلومات المتعلقة بالاستخدامات أو الإرشادات أو التحذيرات أو الاحتياطات أو التفاعلات أو الآثار الضارة أو المخاطر المحتملة التي قد تنطبق على هذا الدواء. هذه المعلومات ليست عبارة عن نصيحة طبية محددة ولا تحل محل المعلومات التي تحصل عليها من مقدم الرعاية الصحية الذي تتبعه. يجب أن تستشير مقدم الرعاية الصحية الذي تتبعه بخصوص المعلومات الكاملة عن مخاطر استخدام هذا الدواء وفوائده.

Last Updated 4/4/17

