

### النطق

(oh si mer ti nib)

### أسماء العلامات التجارية الأمريكية

• Tagrisso

### أسماء العلامات التجارية الكندية

• Tagrisso

### ما هي أوجه استعمال هذا الدواء؟

يُستخدم هذا العقار لعلاج سرطان الرئة.

### ما الذي أحتاج أن أقوله لطبيبي قبل أن أتناول هذا العقار؟

• إذا كنت تعاني من حساسية تجاه أي مكون من مكونات هذا العقار.

• إذا كنت تعاني من الحساسية تجاه أي عقاقير مثل هذا العقار أو أي عقاقير أخرى، أو أطعمة أو أي مواد أخرى. أخبر طبيبك عن نوع الحساسية والعلامات التي ظهرت عليك مثل الطفح الجلدي أو الشرى أو الحكة أو ضيق النفس أو إحداث صوت صفير أثناء التنفس أو السعال أو تورم الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحلق أو أي علامات أخرى.

• إذا كنت تُرضعين رضاعة طبيعية. أوقف الرضاعة الطبيعية أثناء تناول هذا العقار ولمدة أسبوعين على الأقل بعد التوقف عن تناوله.

قد يتفاعل هذا العقار مع العقاقير الأخرى أو المشاكل الصحية الأخرى.

أخبر طبيبك والصيدلي الذي تتعامل معه عن كل العقاقير التي تتناولها (التي صُرفت بوصفة طبية أو العقاقير المتاحة دون وصفة طبية أو المنتجات الطبيعية أو الفيتامينات) ومشاكلك الصحية. يجب أن تراجع جميع العقاقير لتتحقق أنه يمكنك تناول هذا العقار بأمان إضافةً إلى جميع العقاقير التي تتعاطاها وفي وجود كل مشاكلك الصحية. تجنب البدء في تعاطي الجرعة من أي عقار أو إيقافها أو تغييرها دون الرجوع إلى طبيبك.

### ما هي الاحتياطات التي ينبغي اتخاذها عند تناول هذا الدواء؟

• أخبر جميع مقدمي الرعاية الصحية لك بأنك تتناول هذا العقار. ومنهم الأطباء والممرضات والصيدالدة وأطباء الأسنان المعالجين لك.

• ستحتاج إلى الخضوع لفحص وظائف القلب أثناء تناولك لهذا العقار. استشر الطبيب.

• قد تزداد لديك فرصة الإصابة بالعدوى. اغسل يديك بكثرة. ابتعد عن المصابين بعدوى أو نزلات برد أو انفلونزا.

• قد تصاب بنزيف بسهولة أكثر. كن حريصاً، وتجنب الإصابة. ينبغي استعمال فرشاة أسنان ناعمة وماكينته حلاقة كهربائية.

• قد يسبب هذا العقار نوعاً من ضربات القلب غير الطبيعية (فترة QT مطولة). وفي حالة حدوث ذلك، قد ترتفع احتمالية التعرض لأنواع أخرى غير آمنة أو مميتة من ضربات القلب غير الطبيعية. استشر الطبيب.

• إذا كنت تبلغ من العمر 65 عاماً أو أكثر، فيرجى استعمال هذا الدواء مع توخي الحذر. فقد يؤدي ذلك إلى ظهور مزيد من الأعراض الجانبية.

• قد يؤثر هذا العقار على الخصوبة. قد تتسبب مشكلات الخصوبة في عدم قدرتك على الحمل أو قدرتك على الإنجاب. بالنسبة للرجال والنساء، قد تزول هذه المشكلات وتعود إلى حالتك الطبيعية وأحياناً لا تزول. يرجى استشارة طبيبك.

• إذا كنت رجلاً وتمارس الجماع ويمكن أن تحمل زوجتك، فاحرص على أن تجنبها الحمل خلال فترة العلاج ولمدة 4 أشهر بعد إيقاف تناول هذا العقار. وينبغي استعمال وسيلة منع حمل موثوق بها.

• إذا حملت زوجتك أثناء تناولك لهذا العقار أو خلال 4 أشهر بعد آخر جرعة تلقيتها، اتصل بطبيبك على الفور.

• قد يتسبب هذا العقار في إلحاق ضرر بالجنين إذا تناولته وأنت حامل.

• استخدم وسيلة موثوق بها لمنع الحمل أثناء تناول هذا العقار ولمدة 6 أسابيع بعد تناول آخر جرعة.

• في حالة حدوث حمل أثناء تناول هذا العقار أو خلال 6 أسابيع بعد تناول آخر جرعة، اتصل بطبيبك على الفور.

### الأسباب الداعية للاتصال بأخصائي الرعاية الصحية على الفور.

**تحذير/تنبيه:** على الرغم من أن ذلك قد يكون نادرًا، قد تظهر لدى بعض الأشخاص آثار جانبية سيئة للغاية وأحيانًا آثار جانبية مميتة عند تناول أحد العقارات. اخبر طبيبك أو احصل على المساعدة الطبية على الفور إذا ظهرت لديك أي من العلامات أو الأعراض التالية والتي قد تكون مرتبطة بآثار جانبية سيئة للغاية:

• قد تحدث علامات على رد الفعل التحسسي، مثل الطفح الجلدي أو الشرى أو الحكة؛ أو احمرار البشرة أو تورمها أو انتشار البثور عليها أو تقشرها، وبصاحب ذلك حمى أو بدون حمى؛ أو إحداث صفير أثناء التنفس أو ضيق في الصدر أو الحلق، أو صعوبة في التنفس أو الكلام؛ أو حدوث بحة غير عادية أو تورم في الفم أو الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحلق.

• أعراض العدوى كالحمى، أو القشعريرة، أو التهاب شديد في الحلق، أو وجود ألم بالأذن أو الجيوب الأنفية، أو السعال، أو زيادة في البلغم أو تغير لونه، أو ألم عند التبول، أو وجود قروح بالفم، أو الإصابة بجرح لا يندمل.

• أعراض نزيف مثل قيء دم أو قيء يشبه ثفل القهوة؛ أو خروج دم في السعال؛ أو ظهور دم في البول؛ أو براز أسود أو أحمر أو قطراني؛ أو نزيف من اللثة؛ أو نزيف مهبلي غير طبيعي؛ أو ظهور كدمات بدون سبب أو زيادة حجمها؛ أو أي نزيف سيء للغاية أو لا يمكنك إيقافه.

• الدوار أو الإغماء.

• سرعة ضربات القلب.

• عدم انتظام ضربات القلب.

• الشعور بالإرهاق أو الضعف الشديد.

• تغيير في القدرة على الإبصار أو ألم بالعين أو تهيج شديد في العين.

• إذا كانت الأضواء الساطعة تزعج عينيك.

• العيون الدامعة

• لقد حدثت مشكلات خطيرة جدًا وأحيانًا مميتة في الرئة أو التنفس عند استخدام هذا العقار. اتصل بطبيبك فورًا إذا كنت تعاني من مشكلات بالرئة أو بالتنفس، مثل صعوبة التنفس أو ضيق النفس أو سعال سواء أصبت به حديثًا أو أصبح أشد سوءًا.

• نادرًا ما حدثت سكتة قلبية لدى الأشخاص الذين يتناولون هذا العقار. وفي بعض الأحيان، أفضى ذلك إلى الوفاة. اتصل بطبيبك على الفور إذا أصبت بضيق في التنفس أو زيادة كبيرة في الوزن أو تورم الذراعين أو الساقين.

## ما هي بعض الآثار الجانبية الأخرى لهذا العقار؟

جميع العقاقير قد تتسبب في آثار جانبية. ومع ذلك، فبعض الناس قد لا يصابون بأي من الآثار الجانبية أو قد يصابون ببعض الآثار الجانبية البسيطة. تحدث إلى طبيبك أو احصل على المساعدة الطبية إذا أزعجتك أو لم تختفي أي من هذه الآثار الجانبية أو أي آثار جانبية أخرى:

• الإسهال أو البراز المتقلقل.

• جفاف الجلد.

• تغير في الأظافر.

• اضطراب المعدة أو قيء.

• عدم الشعور بالجوع.

• الإمساك.

• التهاب الفم أو تقرحات بالفم.

• الشعور بالإرهاق أو الضعف.

• ألم في الظهر.

هذه ليست جميع الآثار الجانبية التي قد تقع. إذا راودتك أي أسئلة عن الأعراض الجانبية، اتصل بطبيبك. استشر طبيبك للحصول على المشورة الطبية بخصوص الآثار الجانبية.

يمكنك الإبلاغ عن الآثار الجانبية إلى وكالة الصحة المحلية لديك.

## ما هي أفضل طريقة لتناول الدواء؟

تناول هذا العقار حسبما أمر طبيبك. وقرأ جميع المعلومات المقدمة لك. واتبع كافة الإرشادات بعناية.

• تناول هذا الدواء عند تناول الطعام أو عند عدم تناوله.

• للحصول على أقصى استفادة، لا تغفل عن تناول أي جرعات.

• احرص على تناول هذا العقار حسب تعليمات طبيبك أو مقدم آخر للرعاية الصحية، حتى لو شعرت بتحسّن.

• إذا كنت تعاني من مشكلات في البلع، يمكنك خلط القرص بأوقيتين (60 مل) من الماء. يُحظر خلط القرص بمياه غازية أو بأي سائل أخرى. قلب الماء جيدًا حتى يتحول القرص إلى قطع صغيرة. يحظر مضغ القرص أو تسخينه. وإنما قم بابتلاعه على الفور.

• بعد الشرب، اشطفي الكوب باستخدام 4 إلى 8 أوقيات (120 إلى 240 مل) من الماء واشربه على الفور.

• من الممكن أن يتناول من يستخدمون أنابيب التغذية هذا العقار. تأكد من استخدام هذا العقار كما تم وصفه لك. اشطف أنبوب التغذية بعد إعطاء هذا العقار.

## ماذا أفعل إذا فاتتني إحدى الجرعات؟

- تجاوز الجرعة الفائتة وتابع جدول الدواء المعتاد.
- يحظر تناول جرعتين في نفس الوقت أو جرعات إضافية.

## كيف يتم تخزين هذا الدواء؟

- يُخزن في درجة حرارة الغرفة.
- احفظ العقار في مكان جاف. يحظر التخزين في الحمام.
- احتفظ بجميع العقاقير في مكان آمن. احتفظ بجميع العقاقير بعيداً عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.
- استشر الصيدلي بخصوص كيفية التخلص من العقاقير غير المستخدمة.

## إرشادات عامة

- إذا لم تتحسن الأعراض أو المشاكل الصحية التي تعاني منها أو إذا ازدادت سوءاً، اتصل بطبيبك.
- يحظر مشاركة العقاقير التي تتناولها مع أشخاص آخرين، ويحظر كذلك تناول أي عقاقير خاصة بشخص آخر.
- احتفظ بقائمة بالعقاقير (الوصفات الطبية والمستحضرات الطبيعية والفيتمينات والعقاقير المتاحة بدون وصفة طبية) الخاصة بك. قدم هذه القائمة لطبيبك.
- يرجى استشارة الطبيب قبل البدء في استخدام أي عقار جديد، وذلك يتضمن العقاقير المتاحة بوصفة أو بدون وصفة طبية أو المستحضرات الطبيعية أو الفيتمينات.
- بعض العقاقير قد تحتوي على نشرة معلومات مريض مختلفة. إذا كانت لديك أية أسئلة عن هذا العقار، يرجى استشارة الطبيب أو الممرض أو الصيدلي الخاص بك أو غيرهم من مقدمي الرعاية الصحية.
- إذا اعتقدت أنك تناولت جرعة زائدة، اتصل بمركز مكافحة السموم لديك أو احصل على الرعاية الطبية على الفور. كن جاهزاً لعرض أو الإخبار عن ما تتناوله وكميته ومتى حدث ذلك.

استخدام معلومات المستهلك وإخلاء المسؤولية: لا ينبغي استخدام هذه المعلومات بغرض تحديد تناول هذا الدواء أو أي دواء آخر من عدمه. فمقدم الرعاية الصحية هو وحده من لديه من المعرفة والتدريب ما يتيح له تحديد أي الأدوية تناسب مريضاً بعينه. هذه المعلومات لا تجيز أي دواء باعتباره آمناً أو فعالاً أو معتمداً لعلاج أي مريض أو أي حالة صحية. هذا ليس إلا ملخصاً موجزاً لمعلومات عامة عن هذا الدواء فحسب. وهو لا يشمل مطلقاً كل المعلومات المتعلقة بالاستخدامات أو الإرشادات أو التحذيرات أو الاحتياطات أو التفاعلات أو الآثار الضارة أو المخاطر المحتملة التي قد تنطبق على هذا الدواء. هذه المعلومات ليست عبارة عن نصيحة طبية محددة ولا تحل محل المعلومات التي تحصل عليها من مقدم الرعاية الصحية الذي تتبعه. يجب أن تستشير مقدم الرعاية الصحية الذي تتبعه بخصوص المعلومات الكاملة عن مخاطر استخدام هذا الدواء وفوائده.

Last Updated 6/27/17

