

النطق

(pan i TOOM yoo mab)

أسماء العلامات التجارية الأمريكية

• Vectibix

أسماء العلامات التجارية الكندية

• Vectibix

تحذير

• عادة ما يصاحب هذا العقار حدوث مشكلات في الجلد مثل حب الشباب أو الحكة أو احمرار الجلد أو الطفح الجلدي أو الجفاف أو التشققات. بالإضافة إلى حدوث مشكلات خطيرة في الجلد وعدوى وتلف في الأنسجة مصاحبة لهذا العقار. أحياناً ما تكون هذه المشكلات خطر على الحياة أو مميتة. أخبر طبيبك بأي تغيرات في الجلد قد تصاب بها.

• قد يحدث رد فعل جلدي خطير (متلازمة ستيفنز-جونسون/انحلال البشرة النخري السمي). ويمكن أن يتسبب في مشكلات صحية خطيرة لا تزول بسهولة وأحياناً يؤدي إلى الوفاة. ينبغي الحصول على المساعدة الطبية فوراً إذا ظهرت عليك أعراض مثل احمرار الجلد أو تورمه أو تقرحه أو تقشره (يصاحب ذلك حمى أو بدون حمى)؛ أو احمرار العينين أو تهيجهما أو قروح في الفم أو الحلق أو الأنف أو العينين.

ما هي أوجه استعمال هذا الدواء؟

• يستخدم هذا العقار لمعالجة السرطان القولوني المستقيمي.

• وقد يتم وصفه لك لأسباب أخرى. يُرجى استشارة الطبيب.

ما الذي أحتاج أن أقوله لطبيبي قبل أن أتناول هذا العقار؟

• إذا كانت لديك حساسية تجاه البانتيوموماب أو أي مشتق آخر من مشتقات هذا الدواء.

• إذا كنت تعاني من الحساسية تجاه أي عقاقير مثل هذا العقار أو أي عقاقير أخرى، أو أطعمة أو أي مواد أخرى. أخبر طبيبك عن نوع الحساسية والعلامات التي ظهرت عليك مثل الطفح الجلدي أو الشرى أو الحكة أو ضيق النفس أو إحداث صوت صغير أثناء التنفس أو السعال أو تورم الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحلق أو أي علامات أخرى.

• إذا كنت تعاني من طفرة جينية معينة (RAS)، أو إن لم تكن تعلم أنك مصاب بهذه الطفرة الجينية.

قد يتفاعل هذا العقار مع العقاقير الأخرى أو المشاكل الصحية الأخرى.

أخبر طبيبك والصيدلي الذي تتعامل معه عن كل العقاقير التي تتناولها (التي صُرفت بوصفة طبية أو العقاقير المتاحة دون وصفة طبية أو المنتجات الطبيعية أو الفيتامينات) ومشاكلك الصحية. يجب أن تراجع جميع العقاقير لتتحقق أنه يمكنك تناول هذا العقار بأمان إضافةً إلى جميع العقاقير التي تتعاطاها وفي وجود كل مشاكلك الصحية. تجنب البدء في تعاطي الجرعة من أي عقار أو إيقافها أو تغييرها دون الرجوع إلى طبيبك.

ما هي الاحتياطات التي ينبغي اتخاذها عند تناول هذا الدواء؟

• أخبر جميع مقدمي الرعاية الصحية لك بأنك تتناول هذا العقار. ومنهم الأطباء والممرضات والصيدالدة وأطباء الأسنان المعالجين لك.

• استشر طبيبك إذا كنت تعاني من اضطراب في المعدة أو قيء أو سيولة في البراز (إسهال) أو عدم الشعور بالجوع. قد تكون هناك طرق لتقليل هذه الآثار الجانبية.

• عليك إجراء فحوصات دموية حسب تعليمات الطبيب. يرجى استشارة الطبيب.

• قم بإجراء فحص للعين حسب توجيهات طبيبك.

• تجنب التعرض لأشعة الشمس والمصباح الشمسي وأسرة أشعة التسمير. واحرص على استخدام كريم واقي للبشرة وارتداء ملابس واقية وغطاء للعينين أثناء تناول هذا الدواء ولمدة لا تقل عن شهرين بعد انتهاء العلاج.

• لقد حدثت أعراض جانبية خطيرة وأحياناً مميتة أثناء تسرب العقار داخل الجسم. أخبر طبيبك إذا أصبت بأي أعراض جانبية حادة أثناء تسرب السائل داخل الجسم.

• وقد صاحب تناول هذا العقار حالة سيئة جدًا من سيولة البراز (الإسهال) وفقدان السوائل (الجفاف)، عند تناوله مع عقاقير العلاج الكيميائي. وقد يؤدي هذا إلى مشكلات في الكلى أو مشكلات صحية أخرى. استشر طبيبك.

• لقد حدثت جلطات دموية عند تناول هذا العقار. كانت هذه الجلطات الدموية مميتة في بعض الأحيان. استشر الطبيب.

• قد لا يفيد هذا العقار الأشخاص المصابون بطفرة جينية معينة. فقد يزداد التورم الذي يعانون منه سوءًا وقد ترتفع فرص الوفاة. استشر الطبيب.

• إذا كنت رجلاً وتمارس الجماع ويمكن أن تحمل زوجتك، فاحرص على أن تجنبها الحمل خلال فترة الرعاية ولمدة 6 أشهر بعدها. وينبغي استعمال وسيلة منع حمل موثوق بها.

• قد يتسبب هذا العقار في إلحاق ضرر بالجنين إذا تناولته وأنتِ حامل.

• استخدمى وسيلة من وسائل منع الحمل التي يمكنك الاعتماد عليها أثناء العلاج وبعد 6 شهر من انتهاء العلاج.

• يجب إخطار طبيبك، إذا كنتِ حاملًا أو تخططين للحمل. لا بد من التشاور بخصوص المزايا والمخاطر المرتبطة باستعمال هذا العقار أثناء حملك.

• يجب إخطار طبيبك، إذا كنتِ ترضعين رضاعة طبيعية. لا بد من التشاور بخصوص أي مخاطر قد يتعرض لها طفلك.

الأسباب الداعية للاتصال بأخصائي الرعاية الصحية على الفور.

تحذير/تنبيه: على الرغم من أن ذلك قد يكون نادرًا، قد تظهر لدى بعض الأشخاص آثار جانبية سيئة للغاية وأحيانًا آثار جانبية مميتة عند تناول أحد العقارات. اخبر طبيبك أو احصل على المساعدة الطبية على الفور إذا ظهرت لديك أي من العلامات أو الأعراض التالية والتي قد تكون مرتبطة بآثار جانبية سيئة للغاية:

• قد تحدث علامات على رد الفعل التحسسي، مثل الطفح الجلدي أو الشرى أو الحكة؛ أو احمرار البشرة أو تورمها أو انتشار البثور عليها أو تقشرها، ويصاحب ذلك حمى أو بدون حمى؛ أو إحداهن صغير أثناء التنفس أو ضيق في الصدر أو الحلق، أو صعوبة في التنفس أو الكلام؛ أو حدوث بحّة غير عادية أو تورم في الفم أو الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحلق.

• علامات انخفاض مستويات المغنسيوم مثل التغيرات المزاجية وآلام أو وهن العضلات وتقلصات أو تشنجات في العضلات ونوبات صرع أو رعشة أو عدم الشعور بالجوع أو اضطراب شديد في المعدة أو قيء أو عدم انتظام ضربات القلب.

• غثيان أو قيء شديد.

• براز شديد السيولة (إسهال).

• تغيير في القدرة على الإبصار أو ألم بالعين أو تهيج شديد في العين.

• عدم القدرة على التبول أو تغييرات في كمية البول.

• آلام أو ضغوط الصدر.

• سعال مصحوب بدم.

• جفاف الفم.

• التهاب الفم أو تقرحات بالفم.

• احمرار أو تورم في موضع الحقن.

• إمساك شديد.

• الشعور بالإرهاق أو الضعف الشديد.

• تورم اليدين أو القدمين.

• تغير في البشرة أو الأظافر.

• لقد حدثت مشكلات خطيرة جدًا وأحيانًا مميتة في الرئة عند استخدام هذا العقار. اتصل بطبيبك فورًا إذا كنت تعاني من مشكلات بالرئة أو بالتنفس، مثل صعوبة التنفس أو ضيق النفس أو سعال سواء أصبت به حديثًا أو أصبح أشد سوءًا.

ما هي بعض الآثار الجانبية الأخرى لهذا العقار؟

جميع العقاقير قد تتسبب في آثار جانبية. ومع ذلك، فبعض الناس قد لا يصابون بأي من الآثار الجانبية أو قد يصابون ببعض الآثار الجانبية البسيطة. تحدث إلى طبيبك أو احصل على المساعدة الطبية إذا أزعجتك أو لم تختفي أي من هذه الآثار الجانبية أو أي آثار جانبية أخرى:

• تهيج العين.

• الشعور بالإرهاق أو الضعف.

• ألم في البطن.

• اضطراب المعدة أو قيء.

• الإسهال أو البراز المتقلقل.

• نمو الرموش.

هذه ليست جميع الآثار الجانبية التي قد تقع. إذا راودتك أي أسئلة عن الأعراض الجانبية، اتصل بطبيبك. استشر طبيبك للحصول على المشورة الطبية بخصوص الآثار الجانبية.

يمكنك الإبلاغ عن الآثار الجانبية إلى وكالة الصحة المحلية لديك.

ما هي أفضل طريقة لتناول الدواء؟

تناول هذا العقار حسبما أمر طبيبك. واقرأ جميع المعلومات المقدمة لك. واتبع كافة الإرشادات بعناية.

• يتم إعطاء هذا الدواء كحقن في الوريد على مدى فترة معينة من الوقت.

ماذا أفعل إذا فاتتني إحدى الجرعات؟

• اتصل بطبيبك لمعرفة ما يتعين عليك فعله.

كيف يتم تخزين هذا الدواء؟

• إذا كنت تريد تخزين هذا العقار في المنزل، فتحدث إلى طبيبك أو الممرضة أو الصيدلي حول كيفية تخزينه.

إرشادات عامة

• إذا لم تتحسن الأعراض أو المشاكل الصحية التي تعاني منها أو إذا ازدادت سوءاً، اتصل بطبيبك.

• يحظر مشاركة العقاقير التي تتناولها مع أشخاص آخرين، ويحظر كذلك تناول أي عقاقير خاصة بشخص آخر.

• احتفظ بقائمة بالعقاقير (الوصفات الطبية والمستحضرات الطبيعية والفيتامينات والعقاقير المتاحة بدون وصفة طبية) الخاصة بك. قدم هذه القائمة لطبيبك.

• يرجى استشارة الطبيب قبل البدء في استخدام أي عقار جديد، وذلك يتضمن العقاقير المتاحة بوصفة أو بدون وصفة طبية أو المستحضرات الطبيعية أو الفيتامينات.

• احتفظ بجميع العقاقير في مكان آمن. احتفظ بجميع العقاقير بعيداً عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.

• استشر الصيدلي بخصوص كيفية التخلص من العقاقير غير المستخدمة.

• بعض العقاقير قد تحتوي على نشرة معلومات مريض مختلفة. إذا كانت لديك أية أسئلة عن هذا العقار، يرجى استشارة الطبيب أو الممرض أو الصيدلي الخاص بك أو غيرهم من مقدمي الرعاية الصحية.

• إذا اعتقدت أنك تناولت جرعة زائدة، اتصل بمركز مكافحة السموم لديك أو احصل على الرعاية الطبية على الفور. كن جاهزاً لعرض أو الإخبار عن ما تتناوله وكميته ومتى حدث ذلك.

استخدام معلومات المستهلك وإخلاء المسؤولية: لا ينبغي استخدام هذه المعلومات بغرض تحديد تناول هذا الدواء أو أي دواء آخر من عدمه. فمقدم الرعاية الصحية هو وحده من لديه من المعرفة والتدريب ما يتيح له تحديد أي الأدوية تناسب مريضاً بعينه. هذه المعلومات لا تجيز أي دواء باعتباره آمناً أو فعالاً أو معتمداً لعلاج أي مريض أو أي حالة صحية. هذا ليس إلا ملخصاً موجزاً لمعلومات عامة عن هذا الدواء فحسب. وهو لا يشمل مطلقاً كل المعلومات المتعلقة بالاستخدامات أو الإرشادات أو التحذيرات أو الاحتياطات أو التفاعلات أو الآثار الضارة أو المخاطر المحتملة التي قد تنطبق على هذا الدواء. هذه المعلومات ليست عبارة عن نصيحة طبية محددة ولا تحل محل المعلومات التي تحصل عليها من مقدم الرعاية الصحية الذي تتبناه. يجب أن تستشير مقدم الرعاية الصحية الذي تتبناه بخصوص المعلومات الكاملة عن مخاطر استخدام هذا الدواء وفوائده.

Last Updated 2/7/17

