

النطق

(su NIT e nib)

أسماء العلامات التجارية الأمريكية

Sutent •

أسماء العلامات التجارية الكندية

Sutent •

تحذير

•لقد حدثت مشكلات خطيرة جدًا وأحياناً مميتة في الكبد عند استخدام هذا العقار. اتصل بطبيبك فوراً عند ظهور أعراض تشير إلى وجود مشكلة في الكبد مثل بول داكن اللون أو الشعور بالإرهاق أو عدم الشعور بالجوع أو اضطراب في المعدة أو ألم في المعدة أو براز فاتح اللون أو قيء أو اصفرار لون الجلد أو العينين.

ما هي أوجه استعمال هذا الدواء؟

•يُستخدم هذا العقار لعلاج السرطان.

ما الذي أحتاج أن أقوله لطبيبي قبل أن أتناول هذا العقار؟

•إذا كانت لديك حساسية تجاه السونيتينيب أو أي مشتق آخر من مشتقات هذا الدواء.

•إذا كنت تعاني من الحساسية تجاه أي عقاقير مثل هذا العقار أو أي عقاقير أخرى، أو أطعمة أو أي مواد أخرى. أخبر طبيبك عن نوع الحساسية والعلامات التي ظهرت عليك مثل الطفح الجلدي أو الشرى أو الحكة أو ضيق النفس أو إحداث صوت صغير أثناء التنفس أو السعال أو تورم الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحلق أو أي علامات أخرى.

•إذا كنت تتناول أعشاب سانت جونز. يحظر تناول أعشاب سانت جون مع هذا العقار. قد تتأثر فعالية هذا العقار في تلك الحالة.

•هذه ليست قائمة بكل العقاقير أو المشاكل الصحية التي تتفاعل مع هذا العقار.

•أخبر طبيبك والصيدلي الذي تتعامل معه عن كل العقاقير التي تتناولها (التي صُرفت بوصفة طبية أو العقاقير المتاحة دون وصفة طبية أو المنتجات الطبيعية أو الفيتامينات) ومشاكلك الصحية. يجب أن تراجع جميع العقاقير لتتحقق أنه يمكنك تناول هذا العقار بأمان إضافةً إلى جميع العقاقير التي تتعاطاها وفي وجود كل مشاكلك الصحية. تجنب البدء في تعاطي الجرعة من أي عقار أو إيقافها أو تغييرها دون الرجوع إلى طبيبك.

ما هي الاحتياطات التي ينبغي اتخاذها عند تناول هذا الدواء؟

•أخبر جميع مقدمي الرعاية الصحية لك بأنك تتناول هذا العقار. ومنهم الأطباء والمرضات والصيدالة وأطباء الأسنان المعالجين لك.

•لقد حدثت مشكلة خطيرة جدًا وأحياناً مميتة في المخ تُعرف باسم متلازمة الاعتلال الدماغي الخلفي القابلة للعكس (PRES) عند تناول هذا العقار. اتصل بالطبيب فوراً إذا كنت تعاني من أعراض مثل الشعور بالاضطراب أو قلة الانتباه أو تغيير في الرؤية أو فقدان البصر أو نوبات مرضية أو صداع بالغ الخطورة.

•نادراً ما تحدث فتحات في المجرى المعدي المعوي.

•لقد حدثت مشكلات نزيف خطيرة وأحياناً مميتة عند استخدام هذا العقار. يُرجى استشارة الطبيب.

•لقد حدثت مشكلات خطيرة جدًا بالفكين عند استخدام هذا العقار. قم بإجراء فحص للأسنان قبل أن تبدأ في تناول هذا العقار. اعتن بأسنانك جيداً. تحدث إلى طبيبك في هذا الأمر.

•وُجدت مستويات عالية من البروتين في البول وحدثت كذلك مشكلات في الكلى مع هذا العقار. وكانت هذه المُشكلات مميتة في بعض الأحيان. ستحتاج إلى إجراء فحوصات على بولك أثناء تناول هذا العقار. تحدث إلى الطبيب.

•قد يُسبب هذا العقار مشاكل في الغدة الدرقية. يرجى استشارة الطبيب.

•قد تصاب بنزيف بسهولة أكثر. كن حريصاً، وتجنب الإصابة. ينبغي استعمال فرشاة أسنان ناعمة وماكيناة حلاقة كهربائية.

•قد يسبب هذا العقار ارتفاعاً في ضغط الدم.

•افحص ضغط الدم لديك بشكل متكرر. استشر طبيبك.

•قد يعمل هذا العقار على خفض مستويات السكر في الدم. وقد يؤدي ذلك إلى التبول أو ضرورة الذهاب للمستشفى. اتصل بالطبيب فوراً إذا كنت تعاني من أعراض انخفاض نسبة السكر في الدم مثل القلق أو التعرق أو الشعور بضعف أو دوخة أو الشعور بضعف أو سرعة ضربات القلب أو تغير في الرؤية أو صداع أو قشعريرة أو رعشة أو ارتباك أو شعور بالجوع.

•قد يزداد احتمال تعرض مرضى السرطان الذين يتناولون هذا العقار للإصابة بمشكلة صحية شديدة وأحياناً تؤدي للوفاة تدعى متلازمة تحلل الورم (TLS). اتصل بطبيبك على الفور إذا تعرضت لزيادة سرعة ضربات القلب أو عدم انتظام ضربات القلب أو الإغماء أو انسداد في مجرى البول أو ضعف أو تقلص العضلات أو اضطراب المعدة أو القيء أو الإسهال أو عدم القدرة على الأكل أو الشعور بالحمول والكسل.

•هذا العقار قد يؤثر على طريقة اندمال الجروح. إذا اضطرت إلى إجراء عملية جراحية، فينبغي أن تتوقف عن تناول هذا العقار قبل إجراء العملية الجراحية. ابدأ تناول هذا العقار من جديد عقب العملية الجراحية حسب توجيهات الطبيب. استشر طبيبك.

•قد يحدث رد فعل جلدي خطير (متلازمة ستيفنز-جونسون/انحلال البشرة النخري السمي). ويمكن أن يتسبب في مشكلات صحية خطيرة لا تزول بسهولة وأحياناً يؤدي إلى الوفاة. ينبغي الحصول على المساعدة الطبية فوراً إذا ظهرت عليك أعراض مثل احمرار الجلد أو تورمه أو تقرحه أو تقشره (يصاحب ذلك حمى أو بدون حمى)؛ أو احمرار العينين أو تهيجهما أو قروح في الفم أو الحلق أو الأنف أو العينين.

•ينبغي استعمال وسيلة موثوق فيها لمنع الحمل أثناء تناول هذا العقار.

•قد يتسبب هذا العقار في إلحاق ضرر بالجنين إذا تناولته وأنت حامل. وإذا كنت حاملاً أو أصبحت حاملاً أثناء تناول هذا العقار، اتصل بطبيبك على الفور.

•يجب إخطار طبيبك، إذا كنت ترضعين رضاعة طبيعية. لا بد من التشاور بخصوص أي مخاطر قد يتعرض لها طفلك.

الأسباب الداعية للاتصال بأخصائي الرعاية الصحية على الفور.

تحذير/تنبيه: على الرغم من أن ذلك قد يكون نادرًا، قد تظهر لدى بعض الأشخاص آثار جانبية سيئة للغاية وأحياناً آثار جانبية مميتة عند تناول أحد العقارات. أخبر طبيبك أو احصل على المساعدة الطبية على الفور إذا ظهرت لديك أي من العلامات أو الأعراض التالية والتي قد تكون مرتبطة بآثار جانبية سيئة للغاية:

•قد تحدث علامات على رد الفعل التحسسي، مثل الطفح الجلدي أو الشرى أو الحكة؛ أو احمرار البشرة أو تورمها أو انتشار البثور عليها أو تقشرها، ويصاحب ذلك حمى أو بدون حمى؛ أو إحداث صغير أثناء التنفس أو ضيق في الصدر أو الحلق، أو صعوبة في التنفس أو الكلام؛ أو حدوث بحة غير عادية أو تورم في الفم أو الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحلق.

•أعراض نزيف مثل قيء دم أو قيء يشبه ثفل القهوة؛ أو خروج دم في السعال؛ أو ظهور دم في البول؛ أو براز أسود أو أحمر أو قطرائي؛ أو نزيف من اللثة؛ أو نزيف مهلي غير طبيعي؛ أو ظهور كدمات بدون سبب أو زيادة حجمها؛ أو أي نزيف سيء للغاية أو لا يمكنك إيقافه.

•علامات وجود مشكلة في البنكرياس (التهاب البنكرياس) مثل ألم شديد جدًا في المعدة أو ألم شديد جدًا في الظهر أو اضطراب شديد جدًا في المعدة أو قيء.

•أعراض مشاكل الكلى مثل عدم القدرة على التبول أو تغير في كمية البول أو وجود دم في البول أو زيادة كبيرة في الوزن.

•الشعور بتورم أو سخونة أو تنميل أو تغيير في اللون أو ألم في الساق أو الذراع.

•ألم في الفك.

•احمرار أو تهيج راحة اليدين أو أخمص القدمين.

•لقد حدثت مشكلات خطيرة جدًا وأحياناً مميتة بالقلب مثل قصور القلب أو الأزمات القلبية عند استخدام هذا العقار. اتصل بطبيبك على الفور إذا شعرت بضربات قلب غير طبيعية، أو ألم أو ضيق في الصدر، أو صعوبة في التنفس، أو زيادة كبيرة في الوزن، أو تورم في الذراعين أو الساقين.

•حدثت بعض أمراض الدم السيئة للغاية والتي تكون قاتلة في بعض الأحيان مثل الفرفرية القليلة الصفيحات الخثارية / متلازمة انحلال الدم اليوريمية (TTP/HUS) عند استخدام هذا الدواء مع بعض الأشخاص. اتصل بالطبيب على الفور إذا كنت تشعر بالإجهاد الشديد أو الضعف أو إذا كنت تعاني من أي كدمات أو نزيف؛ أو إذا كان بولك داكنًا أو إذا كانت بشرتك أو عينيك صفراء؛ أو إذا كانت بشرتك باهتة؛ أو إذا كانت هناك تغييرات في كمية البول التي تتبولها؛ أو إذا كان هناك تغيير في قدرتك على الإبصار؛ أو تغيير في القوة في جانب واحد بحيث يصبح أقوى من الآخر، أو إذا كنت تعاني من مشكلات في التحدث أو التفكير، أو إذا كنت تعاني من تغيير في التوازن؛ أو من ارتفاع في درجة الحرارة.

ما هي بعض الآثار الجانبية الأخرى لهذا العقار؟

جميع العقاقير قد تتسبب في آثار جانبية. ومع ذلك، فبعض الناس قد لا يصابون بأي من الآثار الجانبية أو قد يصابون ببعض الآثار الجانبية البسيطة. تحدث إلى طبيبك أو احصل على المساعدة الطبية إذا أزعجتك أو لم تختفي أي من هذه الآثار الجانبية أو أي آثار جانبية أخرى:

•الشعور بالإرهاق أو الضعف.

•اضطراب المعدة أو قيء.

•عدم الشعور بالجوع.

•الإسهال أو البراز المتقلقل.

•الإمساك.

•الصداع.

•تغير في لون الشعر.

•تساقط الشعر.

•جفاف الجلد.

•الحكة.

•انعدام القدرة على النوم.

•تغير في القدرة على التدوق.

•جفاف الفم.

•الغازات.

•آلام في العضلات أو المفاصل.

هذه ليست جميع الآثار الجانبية التي قد تقع. إذا راودتك أي أسئلة عن الأعراض الجانبية، اتصل بطبيبك. استشر طبيبك للحصول على المشورة الطبية بخصوص الآثار الجانبية. يمكنك الإبلاغ عن الآثار الجانبية إلى وكالة الصحة المحلية لديك.

ما هي أفضل طريقة لتناول الدواء؟

تناول هذا العقار حسبما أمر طبيبك. وقرأ جميع المعلومات المقدمة لك. واتبع كافة الإرشادات بعناية.

•احرص على تناول هذا العقار حسب تعليمات طبيبك أو مقدم آخر للرعاية الصحية، حتى لو شعرت بتحسن.

•للحصول على أقصى استفادة، لا تغفل عن تناول أي جرعات.

•تناول هذا الدواء عند تناول الطعام أو عند عدم تناوله.

•لا تفتح الكابسولات.

•تجنب تناول الجريب فروت وعصير الجريب فروت.

•استشر طبيبك إذا كنت تعاني من اضطراب في المعدة أو قيء أو سيولة في البراز (إسهال) أو عدم الشعور بالجوع. قد تكون هناك طرق لتقليل هذه الآثار الجانبية.

•قد تحتاج لإجراء مخطط كهربائية القلب (ECG) قبل البدء بتناول هذا العقار وأثناء تناوله. تحدث إلى طبيبك.

•عليك إجراء فحوصات دموية حسب تعليمات الطبيب. يرجى استشارة الطبيب.

•يجب فحص نسبة السكر في الدم حسب توجيهات طبيبك.

ماذا أفعل إذا فاتتني إحدى الجرعات؟

•تناول الجرعة الفائتة فور تذكرك.

•إذا اقترب موعد الجرعة التالية، فتخط الجرعة الفائتة وارجع لمواعيدك العادية.

•يحظر تناول جرعتين في نفس الوقت أو جرعات إضافية.

كيف يتم تخزين هذا الدواء؟

•يُخزن في درجة حرارة الغرفة.

•احفظ العقار في مكان جاف. يحظر التخزين في الحمام.

•احفظ بجميع العقاقير في مكان آمن. احتفظ بجميع العقاقير بعيداً عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.

•استشر الصيدلي بخصوص كيفية التخلص من العقاقير غير المستخدمة.

إرشادات عامة

•إذا لم تتحسن الأعراض أو المشاكل الصحية التي تعاني منها أو إذا ازدادت سوءاً، اتصل بطبيبك.

•يحظر مشاركة العقاقير التي تتناولها مع أشخاص آخرين، ويحظر كذلك تناول أي عقاقير خاصة بشخص آخر.

•احفظ بقائمة بالعقاقير (الوصفات الطبية والمستحضرات الطبيعية والفيتامينات والعقاقير المتاحة بدون وصفة وطبية) الخاصة بك. قدم هذه القائمة لطبيبك.

•يرجى استشارة الطبيب قبل البدء في استخدام أي عقار جديد، وذلك يتضمن العقاقير المتاحة بوصفة أو بدون وصفة طبية أو المستحضرات الطبيعية أو الفيتامينات.

•بعض العقاقير قد تحتوي على نشرة معلومات مريض مختلفة. إذا كانت لديك أية أسئلة عن هذا العقار، يرجى استشارة الطبيب أو الممرض أو الصيدلي الخاص بك أو غيرهم من

مقدمي الرعاية الصحية.

•إذا اعتقدت أنك تناولت جرعة زائدة، اتصل بمركز مكافحة السموم لديك أو حصل على الرعاية الطبية على الفور. كن جاهزاً لعرض أو الإبلاغ عن ما تتناوله وكميته ومتى حدث

ذلك.

استخدام معلومات المستهلك وإخلاء المسؤولية: لا ينبغي استخدام هذه المعلومات بغرض تحديد تناول هذا الدواء أو أي دواء آخر من عدمه. فمقدم الرعاية الصحية هو وحده من لديه من المعرفة والتدريب ما يتيح له تحديد أي الأدوية تناسب مريضاً بعينه. هذه المعلومات لا تجيز أي دواء باعتباره آمناً أو فعالاً أو معتمداً لعلاج أي مريض أو أي حالة صحية. هذا ليس إلا ملخصاً موجزاً لمعلومات عامة عن هذا الدواء فحسب. وهو لا يشمل مطلقاً كل المعلومات المتعلقة بالاستخدامات أو الإرشادات أو التحذيرات أو الاحتياطات أو التفاعلات أو الآثار الضارة أو المخاطر المحتملة التي قد تنطبق على هذا الدواء. هذه المعلومات ليست عبارة عن نصيحة طبية محددة ولا تحل محل المعلومات التي تحصل عليها من مقدم الرعاية الصحية الذي تتبعه. يجب أن تستشير مقدم الرعاية الصحية الذي تتبعه بخصوص المعلومات الكاملة عن مخاطر استخدام هذا الدواء وفوائده.

