

النطق

(zoe le DRON ik AS id)

أسماء العلامات التجارية الأمريكية

- Reclast
- Zometa

أسماء العلامات التجارية الكندية

- Aclasta
- Taro-Zoledronic Acid
- Taro-Zoledronic Acid Concentrate
- Zoledronic Acid Injection
- Zoledronic Acid for Injection
- Zoledronic Acid Z
- Zometa Concentrate

ما هي أوجه استعمال هذا الدواء؟

- يُستخدم هذا العقار لعلاج ارتفاع مستويات الكالسيوم.
- يستخدم هذا الدواء في علاج عدة أنواع من السرطان.
- يستخدم هذا العقار لعلاج داء باجيت.
- يستخدم هذا العقار للوقاية من تآكل العظام (هشاشة العظام) أو علاجه.
- وقد يتم وصفه لك لأسباب أخرى. يُرجى استشارة الطبيب.

ما الذي أحتاج أن أقوله لطبيبي قبل أن أتناول هذا العقار؟

- إذا كنت تعاني من حساسية تجاه حمض الزوليدرونك أو أي مشتق آخر من مشتقات هذا العقار.
- إذا كنت تعاني من الحساسية تجاه أي عقاقير مثل هذا العقار أو أي عقاقير أخرى، أو أطعمة أو أي مواد أخرى. أخبر طبيبك عن نوع الحساسية والعلامات التي ظهرت عليك مثل الطفح الجلدي أو الشرى أو الحكة أو ضيق النفس أو إحداث صوت صفير أثناء التنفس أو السعال أو تورم الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحلق أو أي علامات أخرى.
- إذا كنت تعاني من انخفاض معدلات الكالسيوم.
- إذا كنت تعاني من مرض في الكلى.
- إذا كنت تتناول أو ستتناول عقارًا آخرًا مشابهًا لهذا.
- إذا كنت تتناول عقارًا آخر يحتوي على نفس العقار.
- إذا كنت حاملًا أو من المحتمل أن تكوني حاملًا. لا تتناوليها إذا كنت حاملًا.
- إذا كنت ترضعين رضاعة طبيعية أو تخططين للإرضاع رضاعة طبيعية.
- هذه ليست قائمة بكل العقاقير أو المشاكل الصحية التي تتفاعل مع هذا العقار.

أخبر طبيبك والصيدلي الذي تتعامل معه عن كل العقاقير التي تتناولها (التي صُرفت بوصفة طبية أو العقاقير المتاحة دون وصفة طبية أو المنتجات الطبيعية أو الفيتامينات) ومشاكلك الصحية. يجب أن تراجع جميع العقاقير لتتحقق أنه يمكنك تناول هذا العقار بأمان إضافةً إلى جميع العقاقير التي تتعاطاها وفي وجود كل مشاكلك الصحية. تجنب البدء في تعاطي الجرعة من أي عقار أو إيقافها أو تغييرها دون الرجوع إلى طبيبك.

ما هي الاحتياطات التي ينبغي اتخاذها عند تناول هذا الدواء؟

فيما يتعلق بجميع استخدامات هذا العقار:

- أخبر جميع مقدمي الرعاية الصحية لك بأنك تتناول هذا العقار. ومنهم الأطباء والممرضات والصيدالدة وأطباء الأسنان المعالجين لك.

•ازداد الربو سوءاً لدى الأشخاص الذين يتناولون عقاقير مثل هذا العقار. استشر الطبيب.

•قد يزيد هذا العقار من فرص التعرض لكسر بالساق. استشر الطبيب.

•عليك إجراء فحوصات دموية حسب تعليمات الطبيب. يرجى استشارة الطبيب.

•احرص على عمل فحص كثافة العظام وفق تعليمات طبيبك. استشر الطبيب.

•تناول الكالسيوم وفيتامين د وفقاً لتوجيهات طبيبك.

•افحص أسنانك قبل بدء تناول هذا الدواء.

•اعتن بأسنانك. مع الذهاب إلى طبيب الأسنان بشكل دوري.

•يحظر إعطاء هذا الدواء للأطفال.. يرجى استشارة أخصائي الرعاية الطبية.

•إذا كنت تبلغ من العمر 65 عاماً أو أكثر، فيرجى استعمال هذا الدواء مع توخي الحذر. فقد يؤدي ذلك إلى ظهور مزيد من الأعراض الجانبية.

•ينبغي استعمال وسيلة موثوق فيها لمنع الحمل أثناء تناول هذا العقار.

•قد يتسبب هذا العقار في إلحاق ضرر بالجنين إذا تناولته وأنت حامل. وإذا كنتِ حاملاً أو أصبحتِ حاملاً أثناء تناول هذا العقار، اتصلي بطبيبك على الفور.

يستخدم هذا العقار للمحافظة على صحة العظام:

•تزداد فعالية هذا العقار عند استعماله مع الكالسيوم/فيتامين د وتمارين حمل الأوزان مثل المشي أو العلاج الطبيعي.

•اتبع نظاماً غذائياً وبرنامج تمارين الذي حدده لك طبيبك.

الأسباب الداعية للاتصال بأخصائي الرعاية الصحية على الفور.

تحذير/تنبيه: على الرغم من أن ذلك قد يكون نادراً، قد تظهر لدى بعض الأشخاص آثار جانبية سيئة للغاية وأحياناً آثار جانبية مميتة عند تناول أحد العقارات. اخبر طبيبك أو احصل على المساعدة الطبية على الفور إذا ظهرت لديك أي من العلامات أو الأعراض التالية والتي قد تكون مرتبطة بآثار جانبية سيئة للغاية:

•قد تحدث علامات على رد الفعل التحسسي، مثل الطفح الجلدي أو الشرى أو الحكة؛ أو احمرار البشرة أو تورمها أو انتشار البثور عليها أو تقشرها، ويصاحب ذلك حمى أو بدون حمى؛ أو إحداث صغير أثناء التنفس أو ضيق في الصدر أو الحلق، أو صعوبة في التنفس أو الكلام؛ أو حدوث بحة غير عادية أو تورم في الفم أو الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحلق.

•علامات انخفاض مستويات الكالسيوم مثل تقلص أو تشنج العضلات أو ترميل أو وخز أو نوبات صرع.

•أعراض مشاكل الكلى مثل عدم القدرة على التبول أو تغير في كمية البول أو وجود دم في البول أو زيادة كبيرة في الوزن.

•ألم شديد في العظام أو المفاصل أو العضلات.

•أي ألم جديد أو غريب في منطقة الأربية أو الورك أو الفخذ.

•ألم في الصدر.

•عدم انتظام ضربات القلب.

•سرعة أو بطء في ضربات القلب.

•تغيير في القدرة على الإبصار أو ألم بالعين أو تهيج شديد في العين.

•بثرات الفم.

•صعوبة في البلع.

•ألم شديد عند البلع.

•الحمى وقشعريرة البرد.

•التهاب الحلق.

•أي كدمات أو نزيف مجهول السبب.

•الشعور بالإرهاق أو الضعف الشديد.

•تغير في الحالة المزاجية.

•ألم في موضع الحقن.

•احمرار أو تورم في موضع الحقن.

•الضعف في جانب واحد من الجسم، أو صعوبة في الكلام أو التفكير، أو تغير في الاتزان، أو تهدل أحد جانبي الوجه، أو عدم وضوح الرؤية.

•قد يتسبب هذا العقار في ظهور مشكلات بعظام الفك. وكلما طال استخدامك لهذا العقار زادت فرص إصابتك بهذه المشكلات. وقد تزداد فرص الإصابة إذا كنت تعاني من السرطان أو مشكلات في الأسنان أو تستخدم أطقم أسنان غير منطوقة، أو تعاني من الأنيميا أو مشكلات تجلط الدم أو عدوى. وقد تزداد فرص الإصابة أيضاً إذا كنت تخضع لعلاج للأسنان، أو لعلاج كيميائي أو إشعاعي، أو تتناول عقاقير أخرى قد تؤدي إلى حدوث مشكلات بعظام الفك مثل تناول بعض العقاقير الأستيرويدية. وتوجد عدة عقاقير قد تتسبب في حدوث ذلك. استشر الطبيب أو الصيدلي الخاص بك إذا لم تكن متأكدًا. واتصل بطبيبك فوراً إذا أصبت بتورم أو ألم بالفك.

ما هي بعض الآثار الجانبية الأخرى لهذا العقار؟

جميع العقاقير قد تتسبب في آثار جانبية. ومع ذلك، فبعض الناس قد لا يصابون بأي من الآثار الجانبية أو قد يصابون ببعض الآثار الجانبية البسيطة. تحدث إلى طبيبك أو احصل على المساعدة الطبية إذا أزعجتك أو لم تختفي أي من هذه الآثار الجانبية أو أي آثار جانبية أخرى:

فيما يتعلق بجميع استخدامات هذا العقار:

- الدوار.
- اضطراب المعدة أو قيء.
- تهييج في موضع الحقن.
- الشعور بالإرهاق أو الضعف.
- ألم في البطن.
- الصداع.
- أعراض شبيهة بالأنفلونزا.
- الإسهال أو البراز المتقلقل.
- آلام في العضلات أو المفاصل.
- ألم في الظهر.

استخدام هذا العقار أثناء علاج السرطان:

- انعدام القدرة على النوم.
- عدم الشعور بالجوع.
- الإمساك.
- فقد الوزن.
- السعال.

هذه ليست جميع الآثار الجانبية التي قد تقع. إذا راودتك أي أسئلة عن الأعراض الجانبية، اتصل بطبيبك. استشر طبيبك للحصول على المشورة الطبية بخصوص الآثار الجانبية. يمكنك الإبلاغ عن الآثار الجانبية إلى وكالة الصحة المحلية لديك.

ما هي أفضل طريقة لتناول الدواء؟

تناول هذا العقار حسبما أمر طبيبك. واقرأ جميع المعلومات المقدمة لك. واتبع كافة الإرشادات بعناية.

فيما يتعلق بجميع استخدامات هذا العقار:

- يتم إعطاء هذا الدواء كحقن في الوريد على مدى فترة معينة من الوقت.
- احرص على تناول كمية كبيرة من السوائل الخالية من مادة الكافيين ما لم ينصحك الطبيب بتناول كمية أقل.

يستخدم هذا العقار للمحافظة على صحة العظام:

- ويمكن إعطاء أسيثامينوفين لتقليل الحمى ونزلات البرد.
- احرص على تناول 2 كوب من السوائل قبل تناول هذا العقار ببضع ساعات على الأقل.

ماذا أفعل إذا فاتتني إحدى الجرعات؟

اتصل بطبيبك لمعرفة ما يتعين عليك فعله.

كيف يتم تخزين هذا الدواء؟

•إذا كنت تريد تخزين هذا العقار في المنزل، فتحدث إلى طبيبك أو الممرضة أو الصيدلي حول كيفية تخزينه.

إرشادات عامة

- إذا لم تتحسن الأعراض أو المشاكل الصحية التي تعاني منها أو إذا ازدادت سوءًا، اتصل بطبيبك.
- يحظر مشاركة العقاقير التي تتناولها مع أشخاص آخرين، ويحظر كذلك تناول أي عقاقير خاصة بشخص آخر.
- احتفظ بقائمة بالعقاقير (الوصفات الطبية والمستحضرات الطبيعية والفيتامينات والعقاقير المتاحة بدون وصفة طبية) الخاصة بك. قدم هذه القائمة لطبيبك.
- يرجى استشارة الطبيب قبل البدء في استخدام أي عقار جديد، وذلك يتضمن العقاقير المتاحة بوصفة أو بدون وصفة طبية أو المستحضرات الطبيعية أو الفيتامينات.
- احتفظ بجميع العقاقير في مكان آمن. احتفظ بجميع العقاقير بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.
- استشر الصيدلي بخصوص كيفية التخلص من العقاقير غير المستخدمة.
- بعض العقاقير قد تحتوي على نشرة معلومات مريض مختلفة. إذا كانت لديك أية أسئلة عن هذا العقار، يرجى استشارة الطبيب أو الممرض أو الصيدلي الخاص بك أو غيرهم من

• إذا اعتقدت أنك تناولت جرعة زائدة، اتصل بمركز مكافحة السموم لديك أو احصل على الرعاية الطبية على الفور. كن جاهزاً لعرض أو الإخبار عن ما تناولته وكميته ومتى حدث ذلك.

استخدام معلومات المستهلك وإخلاء المسؤولية: لا ينبغي استخدام هذه المعلومات بغرض تحديد تناول هذا الدواء أو أي دواء آخر من عدمه. فمقدم الرعاية الصحية هو وحده من لديه من المعرفة والتدريب ما يتيح له تحديد أي الأدوية تناسب مريضاً بعينه. هذه المعلومات لا تجيز أي دواء باعتباره آمناً أو فعالاً أو معتمداً لعلاج أي مريض أو أي حالة صحية. هذا ليس إلا ملخصاً موجزاً لمعلومات عامة عن هذا الدواء فحسب. وهو لا يشمل مطلقاً كل المعلومات المتعلقة بالاستخدامات أو الإرشادات أو التحذيرات أو الاحتياطات أو التفاعلات أو الآثار الضارة أو المخاطر المحتملة التي قد تنطبق على هذا الدواء. هذه المعلومات ليست عبارة عن نصيحة طبية محددة ولا تحل محل المعلومات التي تحصل عليها من مقدم الرعاية الصحية الذي تتبعه. يجب أن تستشير مقدم الرعاية الصحية الذي تتبعه بخصوص المعلومات الكاملة عن مخاطر استخدام هذا الدواء وقوائمه.

Last Updated 2/7/17

